

Handleiding natuurbeheerplan: overzicht beheerpakketten

16/12/2024

Inhoud

Inhoud	1
Beheerpakketten - Terugkerende maatregelen beheereenheden	5
BP_0.0 geen natuurdoelvegetatie.....	5
BP_1.1 Buitendijkse slikken, schorren & estuaria_behoud	5
BP_1.1 Buitendijkse slikken, schorren & estuaria_herstel	5
BP_2.1 Embryonale & wandelende duinen_behoud	6
BP_2.1 Embryonale & wandelende duinen_herstel	7
BP_2.2 Vastgelegde duinen met mossen, grassen of struweel_behoud.....	7
BP_2.2 Vastgelegde duinen met mossen, grassen of struweel_herstel.....	8
BP_2.3 Beboste duinen_behoud	9
BP_2.3 Beboste duinen_herstel	12
BP_3.1 Voedselarme vennen en plassen_behoud	14
BP_3.1 Voedselarme vennen en plassen_herstel.....	16
BP_3.2 Voedselarme, zuur bruingekleurde vennen_behoud.....	17
BP_3.2 Voedselarme, zuur bruingekleurde vennen_herstel.....	18
BP_3.3 Vegetatierijke plassen_behoud	19
BP_3.3 Vegetatierijke plassen_herstel.....	20
BP_3.4 Andere plassen_behoud	21
BP_3.4 Andere plassen_herstel	22
BP_3.5 Stromende wateren_behoud.....	23
BP_3.5 Stromende wateren_herstel	24
BP_3.6 Oevervegetaties_behoud	25
BP_3.6 Oevervegetaties_herstel.....	25
BP_3.7 Moerassen_behoud	26
BP_3.7 Moerassen_herstel	27
BP_4.1 Landduinen_behoud.....	28
BP_4.1 Landduinen_herstel	30
BP_4.2 Vochtige heide & hoogveen_behoud.....	32
BP_4.2 Vochtige heide & hoogveen_herstel.....	34
BP_4.3 Droge heide_behoud	36
BP_4.3 Droge heide_herstel.....	38
BP_4.4 Gedegreerde heide_behoud	40
BP_4.4 Gedegreerde heide_herstel	42
BP_5.1 Droge struwelen_behoud.....	44

BP_5.1 Droge struwelen_herstel.....	44
BP_5.2 Vochtige struwelen_behoud	45
BP_5.2 Vochtige struwelen_herstel	46
BP_5.3 Droge ruigten_behoud.....	47
BP_5.3 Droge ruigten_herstel.....	48
BP_5.4 Vochtige ruigten_behoud	49
BP_5.4 Vochtige ruigten_herstel	50
BP_5.5 Akkers_behoud.....	51
BP_5.5 Akkers_herstel	51
BP_6.1 Binnendijkse slikken en schorren (grasland)_behoud	52
BP_6.1 Binnendijkse slikken en schorren (grasland)_herstel.....	53
BP_6.2 Droge schraalgraslanden_behoud	54
BP_6.2 Droge schraalgraslanden_herstel.....	56
BP_6.3 Vochtige schraalgraslanden_behoud	57
BP_6.3 Vochtige schraalgraslanden_herstel.....	59
BP_6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem_behoud.....	60
BP_6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem_herstel.....	62
BP_6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem_behoud	63
BP_6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem_herstel	65
BP_6.6 Andere soortenrijke graslanden_behoud	66
BP_6.6 Andere soortenrijke graslanden_herstel.....	68
BP_8.1 Mergelgrotten_behoud.....	69
BP_8.1 Mergelgrotten_herstel.....	69
BP_9.1 Droge habitatbossen_behoud	69
BP_9.1 Droge habitatbossen_herstel.....	72
BP_9.2 Vochtige habitatbossen_behoud.....	75
BP_9.2 Vochtige habitatbossen_herstel	78
BP_9.3 Structuurrijk inheemse naaldbossen_behoud	81
BP_9.3 Structuurrijk inheemse naaldbossen_herstel.....	84
BP_9.4 Inheemse bossen	87
BP_9.5 Uitheemse & gemengd inheems-uitheemse bossen.....	90
BP_9.6 Andere bossen & parken.....	92
BP_9.7 Boszoom & -mantel_behoud.....	93
BP_9.7 Boszoom & -mantel_herstel	94
BP_12.1 Mozaïeklandschap.....	95
BP_12.2 Onbeheerde climaxvegetaties	96
Beheerpakketten - Terugkerende maatregelen beheerobjecten	96
BP (invasieve) exoot.....	96
BP Andere weg/pad.....	96
BP_Beek / Rivier	97
BP_Berm.....	98

BP_Boszoom & -mantel	100
BP_Dreef / Bomenrij	101
BP_Gefaseerde maaizone	101
BP_Gefaseerde maaizone leefgebied soorten.....	101
BP_Greppel (laantjes, zouwen)	101
BP_Greppel (laantjes, zouwen) leefgebied soorten.....	102
BP_Haag.....	102
BP_Haag leefgebied soorten	102
BP_Hakhoutzone	102
BP_Hakhoutzone leefgebied soorten.....	103
BP_Half verharde weg/pad.....	103
BP_Hoogstamboomgaard	103
BP_Houtkant / Houtwal.....	104
BP_Houtkant / Houtwal leefgebied soorten.....	104
BP_Kale bodem - microschaal leefgebied soorten	105
BP_Knotboom.....	105
BP_Knotboom leefgebied soorten.....	106
BP_Knuppelpad.....	106
BP_Onverharde weg/pad.....	106
BP_Permanente open plek	107
BP_Plagplek.....	108
BP_Poel.....	109
BP_Poel leefgebied soorten	110
BP_Sloot / Gracht.....	111
BP_Traditionele vijver leefgebied soorten.....	112
BP_Traditionele vijver met maaien leefgebied soorten.....	114
BP_Verharde weg/pad.....	114
BP_Vijver.....	115
Enmalige maatregelen – randvoorwaarden	116
Terreinvoorbereiding.....	116
Aanplant.....	116
Kaalkap.....	116
Individuele kap.....	116
Gefaseerde eindkap (dreven en bomenrijen)	116
Ringen.....	116
Omtrekken	117
Sanitaire kap.....	117
Verwijderen spontane houtige opslag.....	117
Ontstronken.....	117
Aanleggen van overige infrastructuur	117
Afbreken van overige infrastructuur.....	117

Aanleggen van wegen, paden en bruggen.....	117
Afbreken van wegen, paden en bruggen.....	117
Aanleggen van recreatieve infrastructuur.....	117
Afbreken van recreatieve infrastructuur.....	117
Aanleggen van begrazingsinfrastructuur.....	117
Afbreken van begrazingsinfrastructuur.....	117
Aanleggen van bosverjongingsinfrastructuur (boombescherming en rasters).....	117
Afbreken van bosverjongingsinfrastructuur (boombescherming en rasters).....	118
Aanleggen van ecologische infrastructuur.....	118
Afbreken van ecologische infrastructuur.....	118
Aanleggen van monitoringsinfrastructuur.....	118
Afbreken van monitoringsinfrastructuur.....	118
Aanleggen van hydrologische infrastructuur.....	118
Afbreken van hydrologische infrastructuur.....	118
Aanleggen van dienstinfrastructuur.....	118
Afbreken van dienstinfrastructuur.....	118
Aanleggen van jachtinfrastructuur.....	118
Afbreken van jachtinfrastructuur.....	118
Afgraven – uitgraven.....	118
Herprofileren (neutrale grondbalans).....	118
Ophogen.....	118
Plaggen.....	119
Chopperen.....	119
Kruidruimen.....	119
Slibruimen.....	119
Mestgift.....	119
Bekalken.....	119
Belemen.....	120
Uitmijnen.....	120
Beheer bufferend vermogen.....	120
(her)introductie plantensoorten.....	120
(her)introductie diersoorten.....	120
Bestrijding plantensoorten.....	120
Bestrijding diersoorten.....	120
Brandpreventie.....	120
Waterkwaliteitsbeheer.....	120
Tijdelijk droogzetten.....	120
Verstuivingsbeheer.....	120
Andere.....	120

Beheerpakketten - Terugkerende maatregelen beheereenheden

BP_0.0 geen natuurdoelvegetatie

Samenstelling van een beheerpakket is hier niet mogelijk omdat het kan gaan over een te divers assortiment van vegetaties. De beheerder stelt zelf de beheermaatregelen voor in het beheerplan.

Hiervoor kan je in de geodatabank het veld 'SpecifiekBeheerpakket Toelichting' gebruiken en je kan een meer gedetailleerde omschrijving toevoegen als bijlage in het e-loket onder het hoofdstuk 4 beheermaatregelen.

BP_1.1 Buitendijkse slikken, schorren & estuaria_behoud

Beheerpakket "BP_1.1 Buitendijkse slikken, schorren & estuaria_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Permanent nulbeheer							











BP_1.1 Buitendijkse slikken, schorren & estuaria_herstel

Beheerpakket "BP_1.1 Buitendijkse slikken, schorren & estuaria_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Permanent nulbeheer							











BP_2.1 Embryonale & wandelende duinen_behoud

Beheerpakket "BP_2.1 Embryonale & wandelende duinen_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatieperiode (mei - oktober), eventueel later inscharen (juni) ifv broedende vogels of zeldzame planten (vb. orchideeën). Alternatief is kleiner aantal grazers in prille (broed)seizoen (mei-juni), gevolgd door groter aantal na het broedseizoen (vanaf juli).</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,5GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in uitwerpselen. Bij grotere begrazingsblokken eventueel apart inrasteren.</p>							
Permanent nulbeheer							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>							










BP_2.1 Embryonale & wandelende duinen_herstel

Beheerpakket "BP_2.1 Embryonale & wandelende duinen_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoenen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatieseizoenen (mei - oktober), eventueel later inscharen (juni) ifv broedende vogels of zeldzame planten (vb. orchideeën). Alternatief is kleiner aantal grazers in prille (broed)seizoenen (mei-juni), gevolgd door groter aantal na het broedseizoen (vanaf juli).</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,5GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in uitwerpselen. Bij grotere begrazingsblokken eventueel apart inrasteren.</p>							
Permanent nulbeheer							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>							

BP_2.2 Vastgelegde duinen met mossen, grassen of struweel_behoud

Beheerpakket "BP_2.2 Vastgelegde duinen met mossen, grassen of struweel_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoenen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatieseizoenen (mei - oktober), eventueel later inscharen (juni) ifv broedende vogels of zeldzame planten (vb. orchideeën). Alternatief is kleiner aantal grazers in prille (broed)seizoenen (mei-juni), gevolgd door groter aantal na het broedseizoen (vanaf juli).</p> <p>Intensiteit: Maximum 1GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in uitwerpselen. Bij grotere begrazingsblokken eventueel apart inrasteren.</p>							

1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	☰
<p>Tijd: Vanaf augustus.</p> <p>Frequentie: 1x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel. Bevorderen éénjarige plantensoorten kan door plaatselijk (max. 20%) 'diep' te maaien (mes raakt / beschadigd licht bodemoppervlakte).</p>							
Occasioneel maaien	●					●	☰
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Permanent nulbeheer							
Bestrijding plantensoorten			●			●	☰
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>							

BP_2.2 Vastgelegde duinen met mossen, grassen of struweel_herstel








Beheerpakket "BP_2.2 Vastgelegde duinen met mossen, grassen of struweel_herstel"

	📅 Tijd	🕒 Frequentie	📍 Plaats	📏 Grootte	🌿 Intensiteit	📄 Andere	☰
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	☰
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●	●	☰
<p>Tijd: In vegetatieseizoen (mei - oktober), eventueel later inscharen (juni) ivf broedende vogels of zeldzame planten (vb. orchideeën). Alternatief is kleiner aantal grazers in prille (broed)seizoen (mei-juni), gevolgd door groter aantal na het broedseizoen (vanaf juli).</p> <p>Intensiteit: Maximum 1GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in uitwerpselen. Bij grotere begrazingsblokken eventueel apart inrasteren.</p>							

1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	☰
<p>Tijd: Vanaf augustus.</p> <p>Frequentie: 1x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel. Bevorderen éénjarige plantensoorten kan door plaatselijk (max. 20%) 'diep' te maaien (mes raakt / beschadigd licht bodemoppervlakte).</p>							
Occasioneel maaien	●					●	☰
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Permanent nulbeheer							
Bestrijding plantensoorten			●			●	☰
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>							

BP_2.3 Beboste duinen_behoud

Beheerpakket "BP_2.3 Beboste duinen_behoud"














	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Terreinvoorbereiding				●		●	☰
<p>Grootte: Kleinschalig, enkel ter hoogte van verjongingsgroep.</p> <p>Andere: Vermijden verstoring bosbodem (geen bosrees). Behoud van microreliëf / bodemarchief.</p>							
Aanplant						●	☰
<p>Andere: Minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Geen archeofyten. Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Inboeten						●	☰
<p>Andere: Minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Geen archeofyten. Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Vrijstellen						●	☰
<p>Andere: Enkel verwijderen van concurrerende vegetatie.</p>							
Zuivering		●				●	☰
<p>Frequentie: Maximum 1x per 4 jaar.</p> <p>Andere: Zuiveringen eindigen wanneer onderste 2-3 meter van de stammen geen levende taken meer dragen.</p>							
Opsnoeien	●				●	●	☰
<p>Tijd: Juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>							

Vormsnoei	●			●			☰
<p>Tijd: Juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>							
Dunning	●	●		●	●		☰
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van het stamtaal.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). De te kappen bomen zijn regelmatig verspreid over het perceel. Verschillende types dunningen zijn mogelijk (QD, hoogdunning, laagdunning, ...). Hou rekening met beschermde soorten (vleermuizen, burcht, poel,...). Combinatie van terugkerende maatregelen mogen niet leiden tot afname van biomassa gedurende planperiode.</p>							
Groepenkap	●			●	●	●	☰
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Grootte: Maximum grootte: 0,3ha.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van oppervlakte gedurende beheerplanperiode.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Combinatie van terugkerende maatregelen mogen niet leiden tot afname van biomassa gedurende planperiode.</p>							
Individuele kap	●				●		☰
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Combinatie van terugkerende maatregelen mogen niet leiden tot afname van biomassa gedurende planperiode. Geen dreefbomen.</p>							

Hakhoutkap	●	●	●	●		●	☰
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: Enkel voor bestaande hakhoutbossen of nieuw aangeplante bossen.</p> <p>Grootte: Maximum 0,5ha/jaar aaneengesloten. Hakhoutkap onderverdelen in houwen.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Combinatie van terugkerende maatregelen mogen niet leiden tot afname van biomassa gedurende planperiode.</p>							
Brandhoutkap	●					●	☰
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Intensiteit: Jaarlijk maximum 5 m³/hectare.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Voldoende dood hout laten liggen (minstens 4 %). Combinatie van terugkerende maatregelen mogen niet leiden tot afname van biomassa gedurende planperiode.</p>							
Veiligheidskap						●	☰
<p>Andere: Beperkt tot gevaarlijke bomen (kwijnend, dood, instabiel) langs recreatieve voorzieningen of infrastructuur.</p>							
Permanent nulbeheer						●	☰
<p>Andere: Niet in combinatie met andere beheermaatregelen.</p>							
Bestrijding plantensoorten		●				●	☰
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>							

BP_2.3 Beboste duinen_herstel

Beheerpakket "BP_2.3 Beboste duinen_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Terreinvoorbereiding				●		●	
<p>Grootte: Kleinschalig, enkel ter hoogte van verjongingsgroep.</p> <p>Andere: Vermijden verstoring bosbodem (geen bosfrees). Behoud van microreliëf / bodemarchief.</p>							
Aanplant						●	
<p>Andere: Minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Geen archeofyten. Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Inboeten						●	
<p>Andere: Minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Geen archeofyten. Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Vrijstellen						●	
<p>Andere: Enkel verwijderen van concurrerende vegetatie.</p>							
Zuivering		●				●	
<p>Frequentie: Maximum 1x per 4 jaar.</p> <p>Andere: Zuiveringen eindigen wanneer onderste 2-3 meter van de stammen geen levende taken meer dragen.</p>							
Opsnoeien	●					●	
<p>Tijd: Juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>							

Vormsnoei	<p style="text-align: center;">● ●</p> <p>Tijd: Juni tot augustus voor loofbomen. Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>
Dunning	<p style="text-align: center;">● ● ● ●</p> <p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart. Frequentie: Maximum 1x per 6 jaar. Intensiteit: Maximum 25% van het stamtal. Eénmalig 1/3de van het stamtal, indien laatste dunning >12 jaar geleden. Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). De te kappen bomen zijn regelmatig verspreid over het perceel. Verschillende types dunningen zijn mogelijk (QD, hoogdunning, laagdunning, ...). Hou rekening met beschermde soorten (vleermuizen, burcht, poel,...). Combinatie van terugkerende maatregelen mogen niet leiden tot afname van biomassa gedurende planperiode.</p>
Groepenkap	<p style="text-align: center;">● ● ●</p> <p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart. Grootte: Maximum grootte: 0,5ha. Intensiteit: Maximum 25% van oppervlakte gedurende beheerplanperiode. Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Combinatie van terugkerende maatregelen mogen niet leiden tot afname van biomassa gedurende planperiode.</p>
Individuele kap	<p style="text-align: center;">● ●</p> <p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart. Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Combinatie van terugkerende maatregelen mogen niet leiden tot afname van biomassa gedurende planperiode. Geen dreefbomen.</p>

Hakhoutkap	●	●	●	●		●	☰	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: Enkel voor bestaande hakhoutbossen of nieuw aangeplante bossen.</p> <p>Grootte: Maximum 0,5ha/jaar aaneengesloten. Hakhoutkap onderverdelen in houwen.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Combinatie van terugkerende maatregelen mogen niet leiden tot afname van biomassa gedurende planperiode.</p>								
Brandhoutkap	●					●	●	☰
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Intensiteit: Jaarlijk maximum 5 m³/hectare.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Voldoende dood hout laten liggen (minstens 4 %). Combinatie van terugkerende maatregelen mogen niet leiden tot afname van biomassa gedurende planperiode.</p>								
Veiligheidskap						●	☰	
<p>Andere: Beperkt tot gevaarlijke bomen (kwijnend, dood, instabiel) langs recreatieve voorzieningen of infrastructuur.</p>								
Permanent nulbeheer						●	☰	
<p>Andere: Niet in combinatie met andere beheermaatregelen.</p>								
Bestrijding plantensoorten			●			●	☰	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>								

BP_3.1 Voedselarme vennen en plassen_behoud
















Beheerpakket "BP_3.1 Voedselarme vennen en plassen_behoud"

	☰	🕒	📍	○	🌪️	👤	☰
	Tijd	Frequentie	Plaats	Grootte	Intensiteit	Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	☰
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing			●				☰
<p>Plaats: Uitrasteren van oeverdelen overwegen (overwegend oostkant waar de meeste windwerking gebeurt).</p>							
Kruidruimen		●		●	●		☰
<p>Frequentie: Jaarlijks tot zeer lage frequentie (min. 10 jaar), afhankelijk van eutrofiëring.</p> <p>Grootte: Gecontroleerd, enkel kleine plekken (enkele are).</p> <p>Intensiteit: Gefaseerd binnen de poel of tussen verschillende poelen in beheer.</p>							

Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	●			●		●	☰
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Occasioneel maaien	●			●		●	☰
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Afvissen							
Bepoten						●	☰
<p>Andere: Enkel ecologisch verantwoorde visbepoting, met nastreven van goede verhouding witvis versus roofvis. Visbepoting is niet toegestaan bij natuurstreefgebieden voor leefgebied van amfibieën.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	☰
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek							
Tijdelijk droogzetten							














BP_3.1 Voedselarme vennen en plassen_herstel

Beheerpakket "BP_3.1 Voedselarme vennen en plassen_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing			●				
<p>Plaats: Ultrasteren van oeverdelen overwegen (overwegend oostkant waar de meeste windwerking gebeurt).</p>							
Kruidruimen		●		●	●		
<p>Frequentie: Jaarlijks tot zeer lage frequentie (min. 10 jaar), afhankelijk van eutrofiëring.</p> <p>Grootte: Gecontroleerd, enkel kleine plekken (enkele are).</p> <p>Intensiteit: Gefaseerd binnen de poel of tussen verschillende poelen in beheer.</p>							
Slibruimen	●				●		
<p>Tijd: Nazomer of bij laagste waterstand.</p> <p>Intensiteit: Alleen sliblaag mag geruimd worden (geen verstoring van de harde bodem).</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruijtebeheer en maaien in heide)	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Occasioneel maaien	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Afvissen							
Bepoten						●	
<p>Andere: Enkel ecologisch verantwoorde visbepoting, met nastreven van goede verhouding witvis versus roofvis. Visbepoting is niet toegestaan bij natuurstreefbeeld voor leefgebied van amfibieën.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek							
Tijdelijk droogzetten							
















BP_3.2 Voedselarme, zuur bruingleurde vennen_behoud

Beheerpakket "BP_3.2 Voedselarme, zuur bruingleurde vennen_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing			●				
<p>Plaats: Ultrasteren van oeverdelen overwegen (overwegend oostkant waar de meeste windwerking gebeurt).</p>							
Kruidruimen		●		●	●		
<p>Frequentie: Jaarlijks tot zeer lage frequentie (min. 10 jaar), afhankelijk van eutrofiëring.</p> <p>Grootte: Gecontroleerd, enkel kleine plekken (enkele are).</p> <p>Intensiteit: Gefaseerd binnen de poel of tussen verschillende poelen in beheer.</p>							
Occasioneel maaien	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Afvissen							
Bepoten						●	
<p>Andere: Enkel ecologisch verantwoorde visbepoting, met nastreven van goede verhouding witvis versus roofvis. Visbepoting is niet toegestaan bij natuurstreefbeeld voor leefgebied van amfibieën.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek							
Tijdelijk droogzetten							














BP_3.2 Voedselarme, zuur bruingleurde vennen_herstel

Beheerpakket "BP_3.2 Voedselarme, zuur bruingleurde vennen_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing			●				
<p>Plaats: Ultrasteren van oeverdelen overwegen (overwegend oostkant waar de meeste windwerking gebeurt).</p>							
Kruidruimen		●		●	●		
<p>Frequentie: jaarlijks tot zeer lage frequentie (min. 10 jaar), afhankelijk van eutrofiëring</p> <p>Grootte: Gecontroleerd, enkel kleine plekken (enkele are).</p> <p>Intensiteit: gefaseerd binnen de pool of tussen verschillende poelen in beheer</p>							
Slibruimen	●				●		
<p>Tijd: Nazomer of bij laagste waterstand.</p> <p>Intensiteit: Alleen sliblaag mag geruimd worden (geen verstoring van de harde bodem).</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Occasioneel maaien	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Afvissen							
Bepoten						●	
<p>Andere: Enkel ecologisch verantwoorde visbepoting, met nastreven van goede verhouding witvis versus roofvis. Visbepoting is niet toegestaan bij natuurstreefbeeld voor leefgebied van amfibieën.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek							
Tijdelijk droogzetten							
















BP_3.3 Vegetatierijke plassen_behoud

Beheerpakket "BP_3.3 Vegetatierijke plassen_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing			●				
<p>Plaats: Ultrasteren van oeverdelen overwegen (overwegend oostkant waar de meeste windwerking gebeurt).</p>							
Kruidruimen		●		●	●		
<p>Frequentie: Jaarlijks tot zeer lage frequentie (min. 10 jaar), afhankelijk van eutrofiëring.</p> <p>Grootte: Gecontroleerd, enkel kleine plekken (enkele are).</p> <p>Intensiteit: Gefaseerd binnen de poel of tussen verschillende poelen in beheer.</p>							
Occasioneel maaien	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Afvissen							
Bepoten						●	
<p>Andere: Enkel ecologisch verantwoorde visbepoting, met nastreven van goede verhouding witvis versus roofvis. Visbepoting is niet toegestaan bij natuurstreefgebieden voor leefgebied van amfibieën.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek							
Tijdelijk droogzetten							














BP_3.3 Vegetatierijke plassen_herstel

Beheerpakket "BP_3.3 Vegetatierijke plassen_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing			●				
<p>Plaats: Ultrasteren van oeverdelen overwegen (overwegend oostkant waar de meeste windwerking gebeurt).</p>							
Kruidruimen		●		●	●		
<p>Frequentie: jaarlijks tot zeer lage frequentie (min. 10 jaar), afhankelijk van eutrofiëring</p> <p>Grootte: Gecontroleerd, enkel kleine plekken (enkele are).</p> <p>Intensiteit: gefaseerd binnen de poel of tussen verschillende poelen in beheer</p>							
Slibruimen	●				●		
<p>Tijd: Nazomer of bij laagste waterstand.</p> <p>Intensiteit: Alleen sliblaag mag geruimd worden (geen verstoring van de harde bodem).</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heidel)	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Occasioneel maaien	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Afvissen							
Bepoten						●	
<p>Andere: Enkel ecologisch verantwoorde visbepoting, met nastreven van goede verhouding witvis versus roofvis. Visbepoting is niet toegestaan bij natuurstreefbeelden voor leefgebied van amfibieën.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek							
Tijdelijk droogzetten							
















BP_3.4 Andere plassen_behoud

Beheerpakket "BP_3.4 Andere plassen_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing			●				
<p>Plaats: Ultrasteren van oeverdelen overwegen (overwegend oostkant waar de meeste windwerking gebeurt).</p>							
Kruidruimen		●		●	●		
<p>Frequentie: Jaarlijks tot zeer lage frequentie (min. 10 jaar), afhankelijk van eutrofiëring.</p> <p>Grootte: Gecontroleerd, enkel kleine plekken (enkele are).</p> <p>Intensiteit: Gefaseerd binnen de poel of tussen verschillende poelen in beheer.</p>							
Occasioneel maaien	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (look bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Afvissen							
Bepoten						●	
<p>Andere: Enkel ecologisch verantwoorde visbepoting, met nastreven van goede verhouding witvis versus roofvis. Visbepoting is niet toegestaan bij natuurstreefgebieden voor leefgebied van amfibieën.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek							
Tijdelijk droogzetten							











BP_3.4 Andere plassen_herstel

Beheerpakket "BP_3.4 Andere plassen_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing			●				
<p>Plaats: Ultrasteren van oeverdelen overwegen (overwegend oostkant waar de meeste windwerking gebeurt).</p>							
Kruidruimen		●		●	●		
<p>Frequentie: jaarlijks tot zeer lage frequentie (min. 10 jaar), afhankelijk van eutrofiëring</p> <p>Grootte: Gecontroleerd, enkel kleine plekken (enkele arel).</p> <p>Intensiteit: gefaseerd binnen de poel of tussen verschillende poelen in beheer</p>							
Slibruimen	●				●		
<p>Tijd: Nazomer of bij laagste waterstand.</p> <p>Intensiteit: Alleen sliblaag mag geruimd worden (geen verstoring van de harde bodem).</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede ten lage druk-banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Occasioneel maaien	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede ten lage druk-banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Afvissen							
Bepoten						●	
<p>Andere: Enkel ecologisch verantwoorde visbepoting, met nastreven van goede verhouding witvis versus roofvis. Visbepoting is niet toegestaan bij natuurstreefbeelden voor leefgebied van amfibieën.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek							
Tijdelijk droogzetten							












BP_3.5 Stromende wateren_behoud

Beheerpakket "BP_3.5 Stromende wateren_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Slibruimen	●		●	●	●	●	
<p>Tijd: Buiten paai- en broedseizoen (15 maart tot en met 31 juli), met uitzondering van oppervlakkige noodruiming (gehele jaar).</p> <p>Plaats: Deponie van onschadelijke ruimingsproducten is toegestaan binnen een 5 m-zone, voor zover niet schadelijk voor aanwezige vegetatie (met uitzondering van talud). De wetgeving mbt VLAREMA is van toepassing.</p> <p>Grootte: plekken van enkele honderden meter (bij voorkeur één zijde of in blokken). Bij waterlopen >1m breedte: maximum 80% van waterbodemvegetatie ruimen.</p> <p>Intensiteit: Er worden geen droogleggingen of drastische peilverlagingen tijdens de werken voorzien. Alleen sliblaag mag geruimd worden (geen verstoring van de harde bodem).</p> <p>Andere: De uitvoering gebeurt alleen tijdens perioden met normale waterstand en bij voldoende (normale) helderheidsgraad van het beekwater. Alleen de sliblaag mag geruimd worden. De harde bodem mag niet verstoord worden. De aanwezige structuurkwaliteit (bijvoorbeeld holle en bolle oevers) moet maximaal behouden blijven. Er wordt in stroomopwaartse richting gewerkt. Vissen zullen stroomopwaarts proberen te vluchten waardoor ze zich uit de werkzone verplaatsen.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							

BP_3.5 Stromende wateren_herstel

Beheerpakket "BP_3.5 Stromende wateren_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Kruidruimen	●		●	●		●	
<p>Tijd: 1ste maaibeurt vanaf 15 juni, 2de maaibeurt vanaf 15 september / binnen SBZ en VEN 1ste maaibeurt vanaf 1 augustus tot 15 maart.</p> <p>Plaats: Deponie van maaisel is voor onbevaarbare waterlopen toegestaan binnen een 5 m-zone, voor zover niet schadelijk voor aanwezige vegetatie (met uitzondering van talud). Het maaisel moet binnen 10 dagen afgevoerd worden langs bevaarbare waterlopen.</p> <p>Grootte: plekken van enkele honderden meter (bij voorkeur één zijde of in blokken). Bij waterlopen >1m breedte: maximum 80% van waterbodemvegetatie ruimen.</p> <p>Andere: De uitvoering gebeurt alleen tijdens perioden met normale waterstand en bij voldoende (normale) helderheidsgraad van het beekwater.</p>							
Slibruimen	●		●	●	●	●	
<p>Tijd: Buiten paal- en broedseizoen (15 maart tot en met 31 juli), met uitzondering van oppervlakkige noodruimingen (gehele jaar).</p> <p>Plaats: Deponie van onschadelijke ruimingsproducten is toegestaan binnen een 5 m-zone, voor zover niet schadelijk voor aanwezige vegetatie (met uitzondering van talud). De wetgeving mbt VLAREMA is van toepassing.</p> <p>Grootte: plekken van enkele honderden meter (bij voorkeur één zijde of in blokken). Bij waterlopen >1m breedte: maximum 80% van waterbodemvegetatie ruimen.</p> <p>Intensiteit: Er worden geen droogleggingen of drastische peilverlagingen tijdens de werken voorzien. Alleen sliblaag mag geruimd worden (geen verstoring van de harde bodem).</p> <p>Andere: De uitvoering gebeurt alleen tijdens perioden met normale waterstand en bij voldoende (normale) helderheidsgraad van het beekwater. Alleen de sliblaag mag geruimd worden. De harde bodem mag niet verstoord worden. De aanwezige structuurkwaliteit (bijvoorbeeld holle en bolle oevers) moet maximaal behouden blijven. Er wordt in stroomopwaartse richting gewerkt. Vissen zullen stroomopwaarts proberen te vluchten waardoor ze zich uit de werkzone verplaatsen.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							

BP_3.6 Oevervegetaties_behoud

Beheerpakket "BP_3.6 Oevervegetaties_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Permanent nulbeheer							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							














BP_3.6 Oevervegetaties_herstel

Beheerpakket "BP_3.6 Oevervegetaties_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Permanent nulbeheer							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							















BP_3.7 Moerassen_behoud

Beheerpakket "BP_3.7 Moerassen_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens)	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting.</p>							
Occasioneel maaien	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek			●				
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>							











BP_3.7 Moerassen_herstel

Beheerpakket "BP_3.7 Moerassen_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: Vanaf augustus (omwille van zaadzetting).</p> <p>Frequentie: 1x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heidel)	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Gefaseerd maai-beheer (niet ganse perceel ineens)	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting.</p>							
Occasioneel maaien	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek			●				
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>							

BP_4.1 Landduinen_behoud












Beheerpakket "BP_4.1 Landduinen_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,15GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit, bij voorkeur middelgrote grazers (schaap / geit). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,15GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit, bij voorkeur schapen (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							

Geherderde begrazing	●				●	●	☐
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,15GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: bij voorkeur schaaap (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Plaggen	●	●		●	●	●	☐
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: 3-5 jaar voor pioniervegetaties.</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m².</p> <p>Intensiteit: Enkel vegetatie en strooisel, meestal een diepte van 5 tot 10 cm. Het verwijderen van minerale bodem is toegelaten.</p> <p>Andere: Afvoeren of lokaal gebruiken (schapenwachtweide en/of kleinschalig akkerbeheer, enkel haalbaar in grote heidegebieden >100ha).</p>							
Chopperen	●	●		●		●	☐
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: 3-5 jaar voor pioniervegetaties.</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m², maximum 10%.</p> <p>Andere: Afvoeren of lokale hopen creëren in functie van fauna.</p>							
Gefaseerd maai-beheer (niet ganse perceel ineens)				●		●	☐
<p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>							
Beheerbranden	●	●		●	●		☐
<p>Tijd: Natte periode van winter / vroeg voorjaar.</p> <p>Frequentie: Zeer laag (min. 10 jaar).</p> <p>Grootte: Enkel kleine plekken (enkele are).</p> <p>Intensiteit: Gecontroleerd.</p>							

BP_4.1 Landduinen_herstel












Beheerpakket "BP_4.1 Landduinen_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatieseizoen (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,15GVE/ha,jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit, bij voorkeur middelgrote grazers (schaap / geit). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Nabegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: Vanaf augustus (later indien nog te hoog grondwaterpeil).</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit, bij voorkeur middelgrote grazers (schaap / geit). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatieseizoen (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,15GVE/ha,jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit, bij voorkeur schapen (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							

Geherderde begrazing	●				●	●	☒
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,15GVE/ha/jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: bij voorkeur schaaap (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Plaggen	●	●		●	●	●	☒
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: 3-5 jaar voor pioniervegetaties.</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m².</p> <p>Intensiteit: Enkel vegetatie en strooisel, meestal een diepte van 5 tot 10 cm. Het verwijderen van minerale bodem is toegelaten.</p> <p>Andere: Afvoeren of lokaal gebruiken (schapenwachtweide en/of kleinschalig akkerbeheer, enkel haalbaar in grote heidegebieden >100ha)</p>							
Chopperen	●	●		●		●	☒
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: 3-5 jaar voor pioniervegetaties.</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m², maximum 10%.</p> <p>Andere: Afvoeren of lokale hopen creëren in functie van fauna.</p>							
1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	☒
<p>Tijd: Vanaf augustus (omwille van zaadzetting).</p> <p>Frequentie: 1x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>							
Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens)				●		●	☒
<p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>							
Beheerbranden	●	●		●	●		☒
<p>Tijd: Natte periode van winter / vroeg voorjaar.</p> <p>Frequentie: Zeer laag (min. 10 jaar).</p> <p>Grootte: Enkel kleine plekken (enkele are).</p> <p>Intensiteit: Gecontroleerd.</p>							

BP_4.2 Vochtige heide & hoogveen_behoud












Beheerpakket "BP_4.2 Vochtige heide & hoogveen_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatieperiode (mei - oktober), eventueel later inscharen (juni) of uitrasteren ifv zeldzame planten (vb. Klokjesgentiaan).</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,20GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit, bij voorkeur middelgrote grazers (schaap / geit). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatieperiode (mei - oktober), eventueel later inscharen (juni) of uitrasteren ifv zeldzame planten (vb. Klokjesgentiaan).</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,20GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit, bij voorkeur schapen (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Geherderde begrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatieperiode (mei - oktober), eventueel later inscharen (juni) of uitrasteren ifv zeldzame planten (vb. Klokjesgentiaan).</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,20GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Voorkeursmaatregel bij dominantie pijpenstrootje. Te gebruiken grazers: bij voorkeur schaap (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							

Plaggen	●	●	●	●	●	●	☐
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: 3-5 jaar voor pioniervegetaties / 5-15jaar met heide.</p> <p>Plaats: Bij voorkeur kleinschalig of in visgraat-motief (in functie van afwatering).</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m².</p> <p>Intensiteit: Enkel vegetatie en strooisel, meestal een diepte van 5 tot 10 cm. Het verwijderen van minerale bodem is toegelaten.</p> <p>Andere: Afvoeren of lokaal gebruiken (schapenwachtweide en/of kleinschalig akkerbeheer, enkel haalbaar in grote heidegebieden >100ha).</p>							
Chopperen	●	●		●		●	☐
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: 3-5 jaar voor pioniervegetaties / 5-15 jaar met heide.</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m², maximum 10%.</p> <p>Andere: Afvoeren of lokale hopen creëren in functie van fauna.</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	●	●				●	☐
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Frequentie: Om de 2 tot 3 jaar.</p> <p>Andere: Weinig toegepast in vochtige heide.</p>							
Gefaseerd maai-beheer (niet ganse perceel ineens)			●			●	☐
<p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting.</p>							
Occasioneel maaien	●					●	☐
<p>Tijd: Eind augustus tot half oktober.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>							
Beheerbranden	●	●		●	●		☐
<p>Tijd: Natte periode van winter / vroeg voorjaar.</p> <p>Frequentie: Circa om 15 jaar.</p> <p>Grootte: Kleine oppervlakten (wellicht max. 10ha).</p> <p>Intensiteit: Gecontroleerd.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek	●		●				☐
<p>Tijd: Buiten broedseizoen.</p> <p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm dieptel).</p>							

BP_4.2 Vochtige heide & hoogveen_herstel

Beheerpakket "BP_4.2 Vochtige heide & hoogveen_herstel"








	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●		
<p>Tijd: In vegetatiesseizoen (mei - oktober), eventueel later inscharen (juni) of uitrasteren ifv zeldzame planten (vb. Klokjesgentiaan).</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,20GVE/ha.jr.</p>							
Nabegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: Vanaf augustus (later indien nog te hoog grondwaterpeil).</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit, bij voorkeur schapen (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatiesseizoen (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,20GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit, bij voorkeur schapen (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							

Geherderde begrazing	●				●	●	☒
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,20GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Voorkeursmaatregel bij dominantie pijpenstrootje. Te gebruiken grazers: bij voorkeur schaaap (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Plaggen	●	●	●	●	●	●	☒
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: 5-15 jaar.</p> <p>Plaats: Bij voorkeur kleinschalig of in visgraat-motief (in functie van afwatering).</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m².</p> <p>Intensiteit: Enkel vegetatie en strooisel, meestal een diepte van 5 tot 10 cm. Het verwijderen van minerale bodem is toegelaten.</p> <p>Andere: Afvoeren of lokaal gebruiken (schapenwachtweide en/of kleinschalig akkerbeheer, enkel haalbaar in grote heidegebieden >100ha).</p>							
Chopperen	●	●		●		●	☒
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: 3-5 jaar voor pioniervegetaties / 5-15 jaar met heide.</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m², maximum 10%.</p> <p>Andere: Afvoeren of lokale hopen creëren in functie van fauna.</p>							
1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	☒
<p>Tijd: Vanaf augustus (omwille van zaadzetting).</p> <p>Frequentie: 1x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	●	●				●	☒
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Frequentie: Om de 2 tot 3 jaar.</p> <p>Andere: Weinig toegepast in vochtige heide.</p>							

Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens)				●		●	☰
<p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting.</p>							
Occasioneel maaien	●					●	☰
<p>Tijd: Eind augustus tot half oktober.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>							
Beheerbranden	●	●		●	●		☰
<p>Tijd: Natte periode van winter / vroeg voorjaar.</p> <p>Frequentie: Circa om 15 jaar.</p> <p>Grootte: Kleine oppervlakten (wellicht max. 10ha).</p> <p>Intensiteit: Gecontroleerd.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek	●		●				☰
<p>Tijd: Buiten broedseizoen.</p> <p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>							

BP_4.3 Droge heide_behoud












Beheerpakket "BP_4.3 Droge heide_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Akkerbeheer						●	☰
<p>Andere: Enkel als onderdeel van het beheer van grote heidegebieden >100ha. Enkel aanvoer van lokale plagzoden. Geen bijkomende bemesting toegelaten.</p>							
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	☰
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●	●	☰
<p>Tijd: In vegetatieseizoen (mei - oktober), eventueel in winter om verhogen structuurvariatie.</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,30GVE/ha/jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit, bij voorkeur schapen (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	☰
<p>Tijd: In vegetatieseizoen (mei - oktober), eventueel in winter om verhogen structuurvariatie.</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,30GVE/ha/jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit, bij voorkeur schapen (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							

Geherderde begrazing	●				●	●	☰
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober), eventueel in winter om verhogen structuurvariatie.</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,30GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: bij voorkeur schaaap (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Chopperen	●	●		●		●	☰
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: 3-5 jaar voor pioniervegetaties / 5-15 jaar met heide.</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m², maximum 10%.</p> <p>Andere: afvoeren of lokale hopen creëren in functie van fauna</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	●	●		●		●	☰
<p>Tijd: vroeg voorjaar ifv verjonging, November bij aantasting door heidehaantje.</p> <p>Frequentie: Om de 8 tot 10 jaar bij gesloten en éénvormige heide (om de 2 tot 3 jaar bij evolutie of behoud naar heischraal grasland).</p> <p>Grootte: Maximum enkele ha/jr in relatie tot oppervlakte heide / streven naar mozaïek.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede ten lage druk-lbanden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Gefaseerd maai-beheer (niet ganse perceel ineens)			●			●	☰
<p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>							
Occasioneel maaien	●					●	☰
<p>Tijd: Eind augustus tot half oktober.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>							
Beheerbranden	●	●		●	●		☰
<p>Tijd: Natte periode van winter / vroeg voorjaar.</p> <p>Frequentie: Circa om 15 jaar.</p> <p>Grootte: Kleine oppervlakten (wellicht max. 10ha).</p> <p>Intensiteit: Gecontroleerd.</p>							

BP_4.3 Droge heide_herstel

Beheerpakket "BP_4.3 Droge heide_herstel"








	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatieperiode (mei - oktober), eventueel in winter om verhogen structuurvariatie.</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,30GVE/ha,jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit, bij voorkeur schapen (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Nabegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: Vanaf augustus (later indien nog te hoog grondwaterpeil).</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit, bij voorkeur schapen (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatieperiode (mei - oktober), eventueel in winter om verhogen structuurvariatie.</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,30GVE/ha,jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit, bij voorkeur schapen (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							

Geherderde begrazing	●				●	●	☰
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober), eventueel in winter om verhogen structuurvariatie.</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,30GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: bij voorkeur schaaap (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Plaggen	●	●	●	●	●	●	☰
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: 5-15 jaar.</p> <p>Plaats: Bij voorkeur kleinschalig of in visgraat-motief (in functie van afwatering).</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m².</p> <p>Intensiteit: Enkel vegetatie en strooisel, meestal een diepte van 5 tot 10 cm. Het verwijderen van minerale bodem is toegelaten.</p> <p>Andere: Afvoeren of lokaal gebruiken (schapenwachtweide en/of kleinschalig akkerbeheer, enkel haalbaar in grote heidegebieden >100ha).</p>							
Chopperen	●	●		●		●	☰
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: 5-15 jaar.</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m², maximum 10%.</p> <p>Andere: Afvoeren of lokale hopen creëren in functie van fauna.</p>							
1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	☰
<p>Tijd: Vanaf augustus (omwille van zaadzetting).</p> <p>Frequentie: 1x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	●	●		●		●	☰
<p>Tijd: vroeg voorjaar ifv verjonging (late zomer ifv evolutie of behoud heischraal grasland).</p> <p>Frequentie: Om de 8 tot 10 jaar bij gesloten en éénvormige heide (om de 2 tot 3 jaar bij evolutie of behoud naar heischraal grasland).</p> <p>Grootte: Maximum enkele ha/jr in relatie tot oppervlakte heide / streven naar mozaïek.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							

Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens)				●			●	☰
<p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>								
Occasioneel maaien	●						●	☰
<p>Tijd: Eind augustus tot half oktober.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>								
Beheerbranden	●	●		●	●			☰
<p>Tijd: Natte periode van winter / vroeg voorjaar.</p> <p>Frequentie: Circa om 15 jaar.</p> <p>Grootte: Kleine oppervlakten (wellicht max. 10ha).</p> <p>Intensiteit: Gecontroleerd.</p>								

BP_4.4 Gedegradeerde heide_behoud












Beheerpakket "BP_4.4 Gedegradeerde heide_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Akkerbeheer						●	☰
<p>Andere: Enkel als onderdeel van het beheer van grote heidegebieden >100ha. Enkel aanvoer van lokale plagzoden. Geen bijkomende bemesting toegelaten.</p>							
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	☰
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●	●	☰
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober), eventueel in winter om verhogen structuurvariatie.</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,30GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit, bij voorkeur schapen (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	☰
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober), eventueel in winter om verhogen structuurvariatie.</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,30GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit, bij voorkeur schapen (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Geherderde begrazing	●				●	●	☰
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober), eventueel in winter om verhogen structuurvariatie.</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,30GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: bij voorkeur schaap (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							

Plaggen	●	●	●	●	●	●	☰
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: 3-5 jaar voor pioniervegetaties / 5-15jaar met heide.</p> <p>Plaats: Bij voorkeur kleinschalig of in visgraat-motief (in functie van afwatering)</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m².</p> <p>Intensiteit: Enkel vegetatie en strooisel, meestal een diepte van 5 tot 10 cm. Het verwijderen van minerale bodem is toegelaten.</p> <p>Andere: afvoeren of lokaal gebruiken (schapenwachtweide en/of kleinschalig akkerbeheer, enkel haalbaar in grote heidegebieden >100ha)</p>							
Chopperen	●	●		●		●	☰
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: 3-5 jaar voor pioniervegetaties / 5-15 jaar met heide.</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m², maximum 10%.</p> <p>Andere: afvoeren of lokale hopen creëren in functie van fauna</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	●	●		●		●	☰
<p>Tijd: vroeg voorjaar ivv verjonging. November bij aantasting door heidehaantje.</p> <p>Frequentie: Om de 8 tot 10 jaar bij gesloten en éénvormige heide (om de 2 tot 3 jaar bij evolutie of behoud naar heischraal grasland).</p> <p>Grootte: Maximum enkele ha/jr in relatie tot oppervlakte heide / streven naar mozaïek.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens)				●		●	☰
<p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>							
Occasioneel maaien	●					●	☰
<p>Tijd: Eind augustus tot half oktober.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>							

BP_4.4 Gedegradeerde heide_herstel











Beheerpakket "BP_4.4 Gedegradeerde heide_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober), eventueel in winter om verhogen structuurvariatie.</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,30GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit, bij voorkeur schapen (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Nabegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: Vanaf augustus (later indien nog te hoog grondwaterpeil).</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit, bij voorkeur schapen (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober), eventueel in winter om verhogen structuurvariatie.</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,30GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit, bij voorkeur schapen (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							

Geherderde begrazing	●				●	●	☒
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober), eventueel in winter om verhogen structuurvariatie.</p> <p>Intensiteit: Maximum 0,30GVE/ha/jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: bij voorkeur schaaap (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Plaggen	●	●	●	●	●	●	☒
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: 3-5 jaar voor pioniervegetaties / 5-15 jaar met heide.</p> <p>Plaats: Bij voorkeur kleinschalig of in visgraat-motief (in functie van afwatering).</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m².</p> <p>Intensiteit: Enkel vegetatie en strooisel, meestal een diepte van 5 tot 10 cm. Het verwijderen van minerale bodem is toegelaten.</p> <p>Andere: Afvoeren of lokaal gebruiken (schapenwachtweide en/of kleinschalig akkerbeheer, enkel haalbaar in grote heidegebieden >100ha).</p>							
Chopperen	●	●		●		●	☒
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: 3-5 jaar voor pioniervegetaties / 5-15 jaar met heide.</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m², maximum 10%.</p> <p>Andere: Afvoeren of lokale hopen creëren in functie van fauna.</p>							
1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	☒
<p>Tijd: Vanaf augustus (omwille van zaadzetting).</p> <p>Frequentie: 1x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	●	●		●		●	☒
<p>Tijd: vroeg voorjaar ifv verjonging (late zomer ifv evolutie of behoud heischraal grasland).</p> <p>Frequentie: Om de 8 tot 10 jaar bij gesloten en éénvormige heide (om de 2 tot 3 jaar bij evolutie of behoud naar heischraal grasland).</p> <p>Grootte: Maximum enkele ha/jr in relatie tot oppervlakte heide / streven naar mozaïek.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens)				●		●	☒
<p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>							
Occasioneel maaien	●					●	☒
<p>Tijd: Eind augustus tot half oktober.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>							











BP_5.1 Droge struwelen_behoud

Beheerpakket "BP_5.1 Droge struwelen_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Hakhoutkap	●	●		●		●	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Grootte: Maximum 0,5ha/jaar aaneengesloten. Hakhoutkap onderverdelen in houwen.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade.</p>							
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							












BP_5.1 Droge struwelen_herstel

Beheerpakket "BP_5.1 Droge struwelen_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Hakhoutkap	●	●		●		●	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Grootte: Maximum 0,5ha/jaar aaneengesloten. Hakhoutkap onderverdelen in houwen.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade.</p>							
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							












BP_5.2 Vochtige struwelen_behoud

Beheerpakket "BP_5.2 Vochtige struwelen_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Hakhoutkap	●	●		●		●	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Grootte: Maximum 0,5ha/jaar aaneengesloten. Hakhoutkap onderverdelen in houthouwen.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade.</p>							
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek			●				
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>							














BP_5.2 Vochtige struwelen_herstel

Beheerpakket "BP_5.2 Vochtige struwelen_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Hakhoutkap	●	●		●		●	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Grootte: Maximum 0,5ha/jaar aaneengesloten. Hakhoutkap onderverdelen in houwen.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade.</p>							
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek			●				
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>							














BP_5.3 Droge ruigten_behoud

Beheerpakket "BP_5.3 Droge ruigten_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●	●				●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober).</p> <p>Frequentie: Om de 2 à 5 jaar inrasteren, in grote terreinen is scheiding door rasters niet nodig.</p> <p>Andere: Bij kleinere terreinen (<5ha) maai-beheer toepassen, omwille van praktische bezwaren (plaatsen raster).</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	●	●		●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Frequentie: Om de 3 tot 8 jaar.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Gefaseerd maai-beheer (niet ganse perceel ineens)	●	●		●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober</p> <p>Frequentie: Om de 3 tot 8 jaar.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>							
Occasioneel maaien	●	●		●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober</p> <p>Frequentie: Om de 3 tot 8 jaar.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							















BP_5.3 Droge ruigten_herstel

Beheerpakket "BP_5.3 Droge ruigten_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●	●				●	
<p>Tijd: In vegetatieperiode (mei - oktober).</p> <p>Frequentie: Om de 2 à 5 jaar inrasteren, in grote terreinen is scheiding door rasters niet nodig.</p> <p>Andere: Bij kleinere terreinen (<5ha) maaibeheer toepassen, omwille van praktische bezwaren (plaatsen raster).</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heidel)	●	●		●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Frequentie: Om de 2 tot 3 jaar.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens)	●	●		●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober</p> <p>Frequentie: Om de 2 tot 3 jaar.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>							
Occasioneel maaien	●	●		●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober</p> <p>Frequentie: Om de 2 tot 3 jaar.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
















BP_5.4 Vochtige ruigten_behoud

Beheerpakket "BP_5.4 Vochtige ruigten_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●	●			●	●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober).</p> <p>Frequentie: Om de 2 à 5 jaar inrasteren, in grote terreinen is scheiding door rasters niet nodig.</p> <p>Intensiteit: In grasweiden ontstaan spontaan zoomvegetaties indien < 0,3GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Bij kleinere terreinen (<5ha) maaibeheer toepassen, omwille van praktische bezwaren (plaatsen raster).</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	●	●		●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Frequentie: Om de 2 tot 3 jaar.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens)	●	●		●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober</p> <p>Frequentie: Om de 3 tot 8 jaar.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting.</p>							
Occasioneel maaien	●	●		●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober</p> <p>Frequentie: Om de 3 tot 8 jaar.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek			●				
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>							

BP_5.4 Vochtige ruigten_herstel

Beheerpakket "BP_5.4 Vochtige ruigten_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●	●			●	●	
<p>Tijd: In vegetatieperiode (mei - oktober).</p> <p>Frequentie: Om de 2 à 5 jaar inrasteren, in grote terreinen is scheiding door rasters niet nodig.</p> <p>Intensiteit: In grasweiden ontstaan spontaan zoomvegetaties indien < 0,3GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Bij kleinere terreinen (<5ha) maai-beheer toepassen, omwille van praktische bezwaren (plaatsen raster).</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heidel)	●	●		●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Frequentie: Om de 2 tot 3 jaar.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Gefaseerd maai-beheer (niet ganse perceel ineens)	●	●		●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober</p> <p>Frequentie: Om de 2 tot 3 jaar.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting.</p>							
Occasioneel maaien	●	●		●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober</p> <p>Frequentie: Om de 2 tot 3 jaar.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek			●				
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek			●				
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>							

BP_5.5 Akkers_behoud

Beheerpakket "BP_5.5 Akkers_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Akkerbeheer			●		●	●	☰
<p>Plaats: Geen groenbemester of stoppelgewassen. Vlinderbloemigen enkel als herstelbeheer voor uitmijnen fosfaat.</p> <p>Intensiteit: Het akkergewas dun inzaaien (50-100 kg/ha). Enkel ondiepe grondbewerkingen (eggen of ondiep frezen), nooit dieper dan 15cm. Wortelonkruiden (kweek, struisgras, akkerdistel) intensief mechanisch bestrijden in periode tussen oogst en inzaaien.</p> <p>Andere: Gewoonlijk geen bemesting.</p>							













BP_5.5 Akkers_herstel

Beheerpakket "BP_5.5 Akkers_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Akkerbeheer			●		●	●	☰
<p>Plaats: Geen groenbemester of stoppelgewassen.</p> <p>Intensiteit: Het akkergewas dun inzaaien (50-100 kg/ha). Enkel ondiepe grondbewerkingen (eggen of ondiep frezen), nooit dieper dan 15cm. Wortelonkruiden (kweek, struisgras, akkerdistel) intensief mechanisch bestrijden in periode tussen oogst en inzaaien.</p> <p>Andere: Gewoonlijk geen bemesting.</p>							















BP_6.1 Binnendijkse slikken en schorren (grasland)_behoud

Beheerpakket "BP_6.1 Binnendijkse slikken en schorren (grasland)_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●		●		●	●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober), eventueel later inscharen (juni) ifv broedende weidevogels of zeldzame planten (vb. orchideeën). Alternatief is kleiner aantal grazers in prille (broedseizoen (mei-juni), gevolgd door groter aantal na het broedseizoen (vanaf juli).</p> <p>Plaats: Waar mogelijk oevers van poelen, kreekarmen of andere waterlopen met zilt water ook inrasteren.</p> <p>Intensiteit: Maximum 2 GVE/ha jr (1GVE/ha in broedseizoen & 3-4 GVE/ha vanaf juli).</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Herprofilen (neutrale grondbalans)		●		●		●	
<p>Frequentie: Circa om de 10 jaar.</p> <p>Grootte: Laantjes van ca 20-30cm diep en ca 1 m breed.</p> <p>Andere: In functie van herstel greppels of laantjes (oppervlakkige ontwatering), welke in verbinding staan met afvoersloten.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek			●				
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>							












BP_6.1 Binnendijkse slikken en schorren (grasland)_herstel

Beheerpakket "BP_6.1 Binnendijkse slikken en schorren (grasland)_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●		●		●	●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober), eventueel later inscharen (juni) ifv broedende weidevogels of zeldzame planten (vb. orchideeën). Alternatief is kleiner aantal grazers in prille (broedseizoen mei-juni), gevolgd door groter aantal na het broedseizoen (vanaf juli).</p> <p>Plaats: Waar mogelijk oevers van poelen, kreekarmen of andere waterlopen met zilt water ook inrasteren</p> <p>Intensiteit: Maximum 2 GVE/ha,jr (1GVE/ha in broedseizoen & 3-4 GVE/ha vanaf juli).</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Herprofilen (neutrale grondbalans)		●		●		●	
<p>Frequentie: Circa om de 10 jaar.</p> <p>Grootte: Laantjes van ca 20-30cm diep en ca 1 m breed.</p> <p>Andere: In functie van herstel greppels of laantjes (oppervlakkige ontwatering), welke in verbinding staan met afvoersloten.</p>							
Intensief maaien (3 x jaarlijks)(hooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: Indicatieve maaidata: half mei, begin juli en half oktober.</p> <p>Frequentie: 3x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen). Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p>							
Occasioneel maaien						●	
<p>Andere: Enkel als tijdelijke overgangsmaatregel waar mogelijk: let op, vaak moeilijk haalbaar (nat, moeilijk bereikbaar, microreliëf).</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek			●				
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>							

BP_6.2 Droge schraalgraslanden_behoud













Beheerpakket "BP_6.2 Droge schraalgraslanden_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober), eventueel later inscharen (juni) ifv broedende weidevogels of zeldzame planten (vb. orchideeën). Alternatief is kleiner aantal grazers in prille (broed)seizoen (mei-juni), gevolgd door groter aantal na het broedseizoen (vanaf juli).</p> <p>Intensiteit: Maximum 1GVE/ha.jr (bij HT6120: ca 0,3 tot 0,5GVE/ha.jr, hoger bij kleinere gebieden).</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in uitwerpselen. Bij grotere begrazingsblokken eventueel apart inrasteren om gericht te kunnen begrazen / grootste deel grasmat (min. ca 70-80%) kort de winter ingaan.</p>							
Nabegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: Vanaf augustus.</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							

1 x jaarlijks maaien (thooilandbeheer)	●	●			●	☐
<p>Tijd: Vanaf augustus (omwille van zaadzetting).</p> <p>Frequentie: 1x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel. Bevorderen éénjarige plantensoorten kan door plaatselijk (max. 20%) 'diep' te maaien (mes raakt / beschadigd licht bodemoppervlakte).</p>						
Alternierend maaien en begrazen (wisselweidebeheer)					●	☐
<p>Andere: Afvoer maaisel. Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>						
Gefaseerd maai-beheer (niet ganse perceel ineens)			●		●	☐
<p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>						
Bestrijding plantensoorten		●			●	☐
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>						












BP_6.2 Droge schraalgraslanden_herstel

Beheerpakket "BP_6.2 Droge schraalgraslanden_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Nabegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: Vanaf augustus.</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Tijdelijk > 3GVE/ha als herstel. Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Chopperen	●	●		●		●	
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: Om de 5-15 jaar.</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m², maximum 10%.</p> <p>Andere: Ter vervanging van stootbegrazing van schapen. Afvoeren of lokale hopen creëren in functie van fauna.</p>							
Intensief maaien (3 x jaarlijks)(thooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: indicatieve maaidata: half mei, begin juli en half oktober</p> <p>Frequentie: 3x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>							

BP_6.3 Vochtige schraalgraslanden_behoud
















Beheerpakket "BP_6.3 Vochtige schraalgraslanden_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatiesseizoen (mei - oktober), eventueel later inscharen (juni) ifv broedende weidevogels of zeldzame planten (vb. orchideeën). Alternatief is kleiner aantal grazers in prille (broed)seizoen (mei-juni), gevolgd door groter aantal na het broedseizoen (vanaf juli).</p> <p>Intensiteit: Maximum 2 GVE/ha.jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Nabegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: Vanaf augustus (later indien nog te hoog grondwaterpeil).</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatiesseizoen (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							

1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	☒
<p>Tijd: Vanaf augustus (omwille van zaadzetting).</p> <p>Frequentie: 1x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen). Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p>							
Alternerend maaien en begrazen (wisselweidebeheer)						●	☒
<p>Andere: Afvoer maaisel. Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Gefaseerd maai-beheer (niet ganse perceel ineens)			●			●	☒
<p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>							
Bestrijding plantensoorten		●				●	☒
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek		●					☒
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>							












BP_6.3 Vochtige schraalgraslanden_herstel

Beheerpakket "BP_6.3 Vochtige schraalgraslanden_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Nabegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: Vanaf augustus (later indien nog te hoog grondwaterpeil).</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatiesseizoen (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Tijdelijk > 3GVE/ha als herstel. Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Intensief maaien (3 x jaarlijks)(hooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: Indicatieve maaidata: half mei, begin juli en half oktober.</p> <p>Frequentie: 3x per jaar.</p> <p>Andere: afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (look bij balenperser / ophalen balen).</p>							
2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: 1ste maaibeurt juni / 2de maaibeurt augustus-september.</p> <p>Frequentie: 2x per jaar.</p> <p>Andere: afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (look bij balenperser / ophalen balen).</p>							
2 x jaarlijks vroeg maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: 1ste maaibeurt 2de helft mei - 1ste week juni / 2de maaibeurt augustus-september.</p> <p>Frequentie: 2x per jaar.</p> <p>Andere: afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (look bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek			●				
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>							

BP_6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem_behoud















Beheerpakket "BP_6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober), eventueel later inscharen (juni) ifv broedende weidevogels of zeldzame planten (vb. orchideeën). Alternatief is kleiner aantal grazers in prille (broed)seizoen (mei-juni), gevolgd door groter aantal na het broedseizoen (vanaf juli).</p> <p>Intensiteit: Maximum 2 GVE/ha/jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen. Vooral bij kamgraslanden.</p>							
Nabegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: Vanaf augustus.</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							

2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●			●	☰
<p>Tijd: 1ste maaibeurt eind juli begin augustus, 2de maaibeurt september (of nabeweiden), bij nog vrij hoge productie (>6ton drogestof/ha/jr): 1ste maaibeurt juni begin juli / 2de maaibeurt augustus-september</p> <p>Frequentie: 3x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>						
2 x jaarlijks laat maaien (hooilandbeheer)	●	●			●	☰
<p>Tijd: 1ste maaibeurt augustus, 2de maaibeurt oktober (of nabeweiden)</p> <p>Frequentie: 2x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>						
1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●			●	☰
<p>Tijd: 2de helft juli begin augustus (of afgestemd op zeldzame soorten of broedvogels).</p> <p>Frequentie: 2x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>						
Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	●				●	☰
<p>Tijd: 1ste maaibeurt vanaf half mei (juni-begin juli bij nog vrij hoge productie (>6ton drogestof/ha/jr)), nabegrazing vanaf augustus.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel. Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p>						
Alternerend maaien en begrazen (wisselweidebeheer)					●	☰
<p>Andere: Afvoer maaisel. Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>						
Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens)	●		●		●	☰
<p>Tijd: Maairegime bij broedgevallen weidevogels: delen vroeg maaien (uiterlijk 1 juni), andere delen vanaf augustus, eventueel in combinatie met extensief beweiden.</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>						
Bestrijding plantensoorten		●			●	☰
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>						












BP_6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem_herstel

Beheerpakket "BP_6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Nabegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: Vanaf augustus.</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatieperiode (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Tijdelijk > 3GVE/ha als herstel. Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Intensief maaien (3 x jaarlijks)(hooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: Indicatieve maaidata: half mei, begin juli en half oktober.</p> <p>Frequentie: 3x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>							
2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: 1ste maaibeurt eind juli-begin augustus, 2de maaibeurt september (of nabeweiden), bij nog vrij hoge productie (>6ton drogestof/ha/jr): 1ste maaibeurt juni-begin juli / 2de maaibeurt augustus-september.</p> <p>Frequentie: 2x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>							
2 x jaarlijks vroeg maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: 1ste maaibeurt 2de helft mei - 1ste week juni / 2de maaibeurt augustus-september.</p> <p>Frequentie: 2x per jaar.</p> <p>Andere: Bij dominantie van één of enkele grassoorten (vb. met Gestreepte witbol). Afvoer maaisel.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							

BP_6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem_behoud
















Beheerpakket "BP_6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatieperiode (mei - oktober), eventueel later inscharen (juni) ifv broedende weidevogels of zeldzame planten (vb. orchideeën). Alternatief is kleiner aantal grazers in prille (broedseizoen mei-juni), gevolgd door groter aantal na het broedseizoen (vanaf juli).</p> <p>Intensiteit: Maximum 2 GVE/ha/jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Nabegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: vanaf augustus (later indien nog te hoog grondwaterpeil)</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatieperiode (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							

2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●			●	☰
<p>Tijd: 1ste maaibeurt eind juli begin augustus, 2de maaibeurt september (of nabeweiden), bij nog vrij hoge productie (>6ton drogestof/ha/jr): 1ste maaibeurt juni begin juli / 2de maaibeurt augustus-september</p> <p>Frequentie: 2x per jaar.</p> <p>Andere: afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen)</p>						
2 x jaarlijks laat maaien (hooilandbeheer)	●	●			●	☰
<p>Tijd: 1ste maaibeurt augustus, 2de maaibeurt oktober (of nabeweiden)</p> <p>Frequentie: 2x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen)</p>						
1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●			●	☰
<p>Tijd: 2de helft juli begin augustus (of afgestemd op zeldzame soorten of broedvogels).</p> <p>Frequentie: 1x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>						
Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	●				●	☰
<p>Tijd: 1ste maaibeurt vanaf half mei (juni-begin juli bij nog vrij hoge productie (>6ton drogestof/ha/jr)), nabegrazing vanaf augustus.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen). Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p>						
Alternerend maaien en begrazen (wisselweidebeheer)					●	☰
<p>Andere: Afvoer maaisel. Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>						
Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens)	●		●		●	☰
<p>Tijd: Maairegime voor kwartelkoning: delen vroeg maaien (uiterlijk 1 juni), andere delen vanaf augustus, eventueel in combinatie met extensief beweiden</p> <p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>						
Bestrijding plantensoorten		●			●	☰
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>						
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek		●				☰
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>						












BP_6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem_herstel

Beheerpakket "BP_6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Nabegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: Vanaf augustus (later indien nog te hoog grondwaterpeil).</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatieperiode (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Tijdelijk > 3GVE/ha als herstel. Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Intensief maaien (3 x jaarlijks)(hooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: Indicatieve maaidata: half mei, begin juli en half oktober.</p> <p>Frequentie: 3x per jaar.</p> <p>Andere: afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen)</p>							
2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: 1ste maaibeurt eind juli-begin augustus, 2de maaibeurt september (of nabeweiden). Bij nog vrij hoge productie (>6ton drogestof/ha/jr): 1ste maaibeurt juni-begin juli, 2de maaibeurt augustus-september.</p>							
2 x jaarlijks vroeg maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: 1ste maaibeurt 2de helft mei - 1ste week juni / 2de maaibeurt augustus-september</p> <p>Frequentie: 2x per jaar.</p> <p>Andere: bij dominantie met vb. gestreepte witbol. Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen)</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek			●				
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>							

BP_6.6 Andere soortenrijke graslanden_behoud
















Beheerpakket "BP_6.6 Andere soortenrijke graslanden_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Seizoensbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatieseizoen (mei - oktober), eventueel later inscharen (juni) ifv broedende weidevogels of zeldzame planten (vb. orchideeën). Alternatief is kleiner aantal grazers in prille (broed)seizoen (mei-juni), gevolgd door groter aantal na het broedseizoen (vanaf juli).</p> <p>Intensiteit: Maximum 2 GVE/ha/jr.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Nabegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: vanaf augustus (later indien nog te hoog grondwaterpeil)</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatieseizoen (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							

2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●			●	☒
<p>Tijd: 1ste maaibeurt juni-begin juli / 2de maaibeurt augustus-september.</p> <p>Frequentie: 2x per jaar.</p> <p>Andere: afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen)</p>						
2 x jaarlijks laat maaien (hooilandbeheer)	●	●			●	☒
<p>Tijd: 1ste maaibeurt augustus, 2de maaibeurt oktober (of nabeweiden).</p> <p>Frequentie: 2x per jaar.</p> <p>Andere: afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen)</p>						
Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	●				●	☒
<p>Tijd: 1ste maaibeurt vanaf half mei (juni-begin juli bij nog vrij hoge productie (>6ton drogestof/ha/jr)), nabegrazing vanaf augustus.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen). Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p>						
Alternerend maaien en begrazen (wisselweidebeheer)					●	☒
<p>Andere: Afvoer maaisel. Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>						
Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens)			●		●	☒
<p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>						
Bestrijding plantensoorten		●			●	☒
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>						
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek		●				☒
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>						
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek		●				☒
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>						

BP_6.6 Andere soortenrijke graslanden_herstel

Beheerpakket "BP_6.6 Andere soortenrijke graslanden_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Nabegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: Vanaf augustus (later indien nog te hoog grondwaterpeil).</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober).</p> <p>Intensiteit: Tijdelijk > 3GVE/ha als herstel. Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is / te hoog grondwaterpeil.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Intensief maaien (3 x jaarlijks)(hooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: Indicatieve maaidata: half mei, begin juli en half oktober.</p> <p>Frequentie: 3x per jaar.</p> <p>Andere: afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (look bij balenperser / ophalen balen)</p>							
2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: 1ste maaibeurt juni begin juli / 2de maaibeurt augustus-september.</p> <p>Frequentie: 2x per jaar.</p> <p>Andere: afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (look bij balenperser / ophalen balen)</p>							
2 x jaarlijks vroeg maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: 1ste maaibeurt 2de helft mei-1ste week juni / 2de maaibeurt augustus-september.</p> <p>Frequentie: 2x per jaar.</p> <p>Andere: bij dominantie met vb. gestreepte witbol. Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (look bij balenperser / ophalen balen)</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek			●				
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>							




BP_8.1 Mergelgrotten_behoud

Beheerpakket "BP_8.1 Mergelgrotten_behoud"














	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere
Permanent nulbeheer						

BP_8.1 Mergelgrotten_herstel

Beheerpakket "BP_8.1 Mergelgrotten_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere
Permanent nulbeheer						














BP_9.1 Droge habitatbossen_behoud

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Terreinvoorbereiding				●		●	
<p>Grootte: Kleinschalig, enkel ter hoogte van verjongingsgroep.</p> <p>Andere: Vermijden verstoring bosbodem (geen bosfrees). Behoud van microreliëf / bodemarchief.</p>							
Aanplant				●		●	
<p>Grootte: Maximum grootte: 0,3ha.</p> <p>Andere: Minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Minimum 3 sleutelsoorten, die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen. Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Inboeten						●	
<p>Andere: Minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Minimum 3 sleutelsoorten, die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen. Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Vrijstellen						●	
<p>Andere: Enkel verwijderen van concurrerende vegetatie.</p>							
Zuivering		●				●	
<p>Frequentie: Maximum 1x per 4 jaar.</p> <p>Andere: Zuiveringen eindigen wanneer onderste 2-3 meter van de stammen geen levende takken meer dragen.</p>							
Opsnoeien	●				●		
<p>Tijd: Juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>							

Vormsnoei	●				●		☒
<p>Tijd: Juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>							
Dunning	●	●			●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van het stamtal. Kroonhout ter plaatse laten liggen.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). De te kappen bomen zijn regelmatig verspreid over het perceel. Verschillende types dunningen zijn mogelijk (QD, hoogdunning, laagdunning, ...). Hou rekening met beschermde soorten (vleermuizen, burcht, poel,...). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Groepenkap	●			●	●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Grootte: Maximum grootte: 0,3ha.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van oppervlakte gedurende beheerplanperiode.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Individuele kap	●					●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas. Geen dreefbomen.</p>							

Hakhoutkap	●	●	●	●		●	☒
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: Enkel voor bestaande hakhoutbossen of nieuw aangeplante bossen.</p> <p>Grootte: Maximum 0,5ha/jaar aaneengesloten. Hakhoutkap onderverdelen in houwten.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Brandhoutkap	●				●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Intensiteit: Jaarlijk maximum 5 m²/hectare.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Voldoende dood hout laten liggen (minstens 4 %). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Veiligheidskap						●	☒
<p>Andere: Beperkt tot gevaarlijke bomen (kwijnend, dood, instabiel) langs recreatieve voorzieningen of infrastructuur.</p>							
Permanent nulbeheer						●	☒
<p>Andere: Niet in combinatie met andere beheermaatregelen.</p>							
Bestrijding plantensoorten		●				●	☒
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>							

BP_9.1 Droge habitatbossen_herstel














	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Terreinvoorbereiding				●		●	
<p>Grootte: Kleinschalig, enkel ter hoogte van verjongingsgroep.</p> <p>Andere: Vermijden verstoring bosbodem (geen bosfrees). Behoud van microreliëf / bodemarchief.</p>							
Aanplant				●		●	
<p>Grootte: Maximum grootte: 0,5ha.</p> <p>Andere: Minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Minimum 3 sleutelsoorten, die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen. Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Inboeten						●	
<p>Andere: Minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Minimum 3 sleutelsoorten, die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen. Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Vrijstellen						●	
<p>Andere: Enkel verwijderen van concurrerende vegetatie.</p>							
Zuivering		●				●	
<p>Frequentie: Maximum 1x per 4 jaar.</p> <p>Andere: Zuiveringen eindigen wanneer onderste 2-3 meter van de stammen geen levende takken meer dragen.</p>							
Opsnoeien	●				●		
<p>Tijd: Juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>							

Vormsnoei	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	☒
<p>Tijd: Juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>		
Dunning	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 6 jaar.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van het stamtal. Kroonhout ter plaatse laten liggen. Eénmalig 1/3de van het stamtal, indien laatste dunning >12 jaar geleden.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). De te kappen bomen zijn regelmatig verspreid over het perceel. Verschillende types dunningen zijn mogelijk (QD, hoogdunning, laagdunning, ...). Hou rekening met beschermde soorten (vleermuizen, burcht, poel,...). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>		
Groepenkap	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Grootte: Maximum grootte: 0,5ha.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van oppervlakte gedurende beheerplanperiode.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>		
Individuele kap	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas. Geen dreefbomen.</p>		

Hakhoutkap	●	●	●	●		●	☒	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: Enkel voor bestaande hakhoutbossen of nieuw aangeplante bossen.</p> <p>Grootte: Maximum 0,5ha/jaar aaneengesloten. Hakhoutkap onderverdelen in houwen.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>								
Brandhoutkap	●					●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Intensiteit: Jaarlijk maximum 5 m³/hectare.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Voldoende dood hout laten liggen (minstens 4 %). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>								
Veiligheidskap						●		☒
<p>Andere: Beperkt tot gevaarlijke bomen (kwijnend, dood, instabiel) langs recreatieve voorzieningen of infrastructuur.</p>								
Permanent nulbeheer						●		☒
<p>Andere: Niet in combinatie met andere beheermaatregelen.</p>								
Bestrijding plantensoorten			●			●		☒
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>								

BP_9.2 Vochtige habitatbossen_behoud

Beheerpakket "BP_9.2 Vochtige habitatbossen_behoud"














	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Terreinvoorbereiding				●		●	
<p>Grootte: Kleinschalig, enkel ter hoogte van verjongingsgroep.</p> <p>Andere: Vermijden verstoring bosbodem (geen bosfrees). Behoud van microreliëf / bodemarchief.</p>							
Aanplant				●		●	
<p>Grootte: Maximum grootte: 0,3ha.</p> <p>Andere: Minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Minimum 3 sleutelsoorten, die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen. Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Inboeten						●	
<p>Andere: Minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Minimum 3 sleutelsoorten, die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen. Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Vrijstellen						●	
<p>Andere: Enkel verwijderen van concurrerende vegetatie.</p>							
Zuivering		●				●	
<p>Frequentie: Maximum 1x per 4 jaar.</p> <p>Andere: Zuiveringen eindigen wanneer onderste 2-3 meter van de stammen geen levende taken meer dragen.</p>							
Opsnoeien	●				●		
<p>Tijd: Juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>							

Vormsnoei	●				●		☒
<p>Tijd: Juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>							
Dunning	●	●			●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van het stamtal. Kroonhout ter plaatse laten liggen.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). De te kappen bomen zijn regelmatig verspreid over het perceel. Verschillende types dunningen zijn mogelijk (QD, hoogdunning, laagdunning, ...). Hou rekening met beschermde soorten (vleermuizen, burcht, poel...). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Groepenkap	●			●	●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Grootte: Maximum grootte: 0,3ha.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van oppervlakte gedurende beheerplanperiode.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Individuele kap	●					●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas. Geen dreefbomen.</p>							

Hakhoutkap	●	●	●	●		●	☒	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: Enkel voor bestaande hakhoutbossen of nieuw aangeplante bossen.</p> <p>Grootte: Maximum 0,5ha/jaar aaneengesloten. Hakhoutkap onderverdelen in houwen.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>								
Brandhoutkap	●					●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Intensiteit: Jaarlijk maximum 5 m²/hectare.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Voldoende dood hout laten liggen (minstens 4 %). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>								
Veiligheidskap						●	☒	
<p>Andere: Beperkt tot gevaarlijke bomen (kwijnend, dood, instabiel) langs recreatieve voorzieningen of infrastructuur.</p>								
Permanent nulbeheer						●	☒	
<p>Andere: Niet in combinatie met andere beheermaatregelen.</p>								
Bestrijding plantensoorten			●			●	☒	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>								

BP_9.2 Vochtige habitatbossen_herstel

Beheerpakket "BP_9.2 Vochtige habitatbossen_herstel"














	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Terreinvoorbereiding				●		●	
<p>Grootte: Kleinschalig, enkel ter hoogte van verjongingsgroep.</p> <p>Andere: Vermijden verstoring bosbodem (geen bosfrees). Behoud van microreliëf / bodemarchief.</p>							
Aanplant				●		●	
<p>Grootte: Maximum grootte: 0,5ha.</p> <p>Andere: Minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Minimum 3 sleutelsoorten, die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen. Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Inboeten						●	
<p>Andere: Minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Minimum 3 sleutelsoorten, die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen. Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Vrijstellen						●	
<p>Andere: Enkel verwijderen van concurrerende vegetatie.</p>							
Zuivering		●				●	
<p>Frequentie: Maximum 1x per 4 jaar.</p> <p>Andere: Zuiveringen eindigen wanneer onderste 2-3 meter van de stammen geen levende takken meer dragen.</p>							
Opsnoeien	●				●		
<p>Tijd: Juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>							

Vormsnoei	●				●		☒
<p>Tijd: Juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>							
Dunning	●	●			●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 6 jaar.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van het stamtal. Kroonhout ter plaatse laten liggen. Eénmalig 1/3de van het stamtal, indien laatste dunning >12 jaar geleden.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). De te kappen bomen zijn regelmatig verspreid over het perceel. Verschillende types dunningen zijn mogelijk (QD, hoogdunning, laagdunning, ...). Hou rekening met beschermde soorten (vleermuizen, burcht, poel,...). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Groepenkap	●			●	●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Grootte: Maximum grootte: 0,5ha.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van oppervlakte gedurende beheerplanperiode.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Individuele kap	●					●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas. Geen dreefbomen.</p>							

Hakhoutkap	●	●	●	●		●	☒
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: Enkel voor bestaande hakhoutbossen of nieuw aangeplante bossen.</p> <p>Grootte: Maximum 0,5ha/jaar aaneengesloten. Hakhoutkap onderverdelen in houwen.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Brandhoutkap	●					●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Intensiteit: Jaarlijk maximum 5 m³/hectare.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Voldoende dood hout laten liggen (minstens 4 %). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Veiligheidskap						●	☒
<p>Andere: Beperkt tot gevaarlijke bomen (kwijnend, dood, instabiel) langs recreatieve voorzieningen of infrastructuur.</p>							
Permanent nulbeheer						●	☒
<p>Andere: Niet in combinatie met andere beheermaatregelen.</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	☒
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>							

BP_9.3 Structuurrijk inheemse naaldbossen_behoud

Beheerpakket "BP_9.3 Structuurrijk inheemse naaldbossen_behoud"














	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Terreinvoorbereiding				●		●	
<p>Grootte: Kleinschalig, enkel ter hoogte van verjongingsgroep.</p> <p>Andere: Vermijden verstoring bosbodem (geen bosfrees). Behoud van microreliëf / bodemarchief.</p>							
Aanplant				●		●	
<p>Grootte: Maximum grootte: 0,5ha.</p> <p>Andere: Minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Minimum 2 sleutelsoorten, die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen. Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Inboeten						●	
<p>Andere: Minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Minimum 2 sleutelsoorten, die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen. Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Vrijstellen						●	
<p>Andere: Enkel verwijderen van concurrerende vegetatie.</p>							
Zuivering		●				●	
<p>Frequentie: Maximum 1x per 4 jaar.</p> <p>Andere: Zuiveringen eindigen wanneer onderste 2-3 meter van de stammen geen levende taken meer dragen.</p>							
Opsnoeien	●				●		
<p>Tijd: Winter voor naaldbomen / juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>							

Vormsnoei	●			●		☒
<p>Tijd: Winter voor naaldbomen / juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>						
Dunning	●	●		●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van het stamtal. Kroonhout ter plaatse laten liggen.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). De te kappen bomen zijn regelmatig verspreid over het perceel. Verschillende types dunningen zijn mogelijk (QD, hoogdunning, laagdunning, ...). Hou rekening met beschermde soorten (vleermuizen, burcht, poel,...). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>						
Groepenkap	●		●	●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Grootte: Maximum grootte: 0,5ha.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van oppervlakte gedurende beheerplanperiode.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>						
Individuele kap	●				●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas. Geen dreefbomen.</p>						

Hakhoutkap	●	●	●	●		●	☒	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: Enkel voor bestaande hakhoutbossen of nieuw aangeplante bossen.</p> <p>Grootte: Maximum 0,5ha/jaar aaneengesloten. Hakhoutkap onderverdelen in houwen.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>								
Brandhoutkap	●					●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Intensiteit: Jaarlijk maximum 5 m²/hectare.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Voldoende dood hout laten liggen (minstens 4 %). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>								
Veiligheidskap						●	☒	
<p>Andere: Beperkt tot gevaarlijke bomen (kwijnend, dood, instabiel) langs recreatieve voorzieningen of infrastructuur.</p>								
Permanent nulbeheer						●	☒	
<p>Andere: Niet in combinatie met andere beheermaatregelen.</p>								
Bestrijding plantensoorten		●				●	☒	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>								

BP_9.3 Structuurrijk inheemse naaldbossen_herstel

Beheerpakket "BP_9.3 Structuurrijk inheemse naaldbossen_herstel"















	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Terreinvoorbereiding				●		●	
<p>Grootte: Kleinschalig, enkel ter hoogte van verjongingsgroep.</p> <p>Andere: Vermijden verstoring bosbodem (geen bosfrees). Behoud van microreliëf / bodemarchief.</p>							
Aanplant				●		●	
<p>Grootte: Maximum grootte: 0,5ha.</p> <p>Andere: Minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Minimum 2 sleutelsoorten, die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen. Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Inboeten						●	
<p>Andere: Minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Minimum 2 sleutelsoorten, die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen. Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Vrijstellen						●	
<p>Andere: Enkel verwijderen van concurrerende vegetatie.</p>							
Zuivering		●				●	
<p>Frequentie: Maximum 1x per 4 jaar.</p> <p>Andere: Zuiveringen eindigen wanneer onderste 2-3 meter van de stammen geen levende takken meer dragen.</p>							
Opsnoeien	●				●		
<p>Tijd: Winter voor naaldbomen / juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>							

Vormsnoei	●			●		☒
<p>Tijd: Winter voor naaldbomen / juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>						
Dunning	●	●		●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 6 jaar.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van het stamtal. Kroonhout ter plaatse laten liggen. Eénmalig 1/3de van het stamtal, indien laatste dunning >12 jaar geleden.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). De te kappen bomen zijn regelmatig verspreid over het perceel. Verschillende types dunningen zijn mogelijk (QD, hoogdunning, laagdunning, ...). Hou rekening met beschermde soorten (vleermuizen, burcht, poel...). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>						
Groepenkap	●		●	●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Grootte: Maximum grootte: 0,5ha.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van oppervlakte gedurende beheerplanperiode.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>						
Individuele kap	●				●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas. Geen dreefbomen.</p>						

Hakhoutkap	●	●	●	●		●	☒
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: Enkel voor bestaande hakhoutbossen of nieuw aangeplante bossen.</p> <p>Grootte: Maximum 0,5ha/jaar aaneengesloten. Hakhoutkap onderverdelen in houwen.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Brandhoutkap	●				●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Intensiteit: Jaarlijk maximum 5 m²/hectare.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Voldoende dood hout laten liggen (minstens 4 %). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Veiligheidskap						●	☒
<p>Andere: Beperkt tot gevaarlijke bomen (kwijnend, dood, instabiel) langs recreatieve voorzieningen of infrastructuur.</p>							
Permanent nulbeheer						●	☒
<p>Andere: Niet in combinatie met andere beheermaatregelen.</p>							
Bestrijding plantensoorten		●				●	☒
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>							

BP_9.4 Inheemse bossen

Beheerpakket "BP_9.4 Inheemse bossen"















	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Terreinvoorbereiding				●		●	
<p>Grootte: Kleinschalig, enkel ter hoogte van verjongingsgroep.</p> <p>Andere: Vermijden verstoring bosbodem (geen bosfrees). Behoud van microreliëf / bodemarchief.</p>							
Aanplant				●		●	
<p>Grootte: Maximum grootte: 0,5ha.</p> <p>Andere: Bij aanplant van boom- en struiksoorten dient het standstillbeginsel in acht worden genomen. Het aanplanten van invasieve uitheemse soorten is uitgesloten. Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Inboeten						●	
<p>Andere: Bij aanplant van boom- en struiksoorten dient het standstillbeginsel in acht worden genomen. Het aanplanten van invasieve uitheemse soorten is uitgesloten. Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Vrijstellen						●	
<p>Andere: Enkel verwijderen van concurrerende vegetatie.</p>							
Zuivering		●				●	
<p>Frequentie: Maximum 1x per 4 jaar.</p> <p>Andere: Zuiveringen eindigen wanneer onderste 2-3 meter van de stammen geen levende takken meer dragen.</p>							
Opsnoeien	●				●		
<p>Tijd: Juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>							
Vormsnoei	●				●		
<p>Tijd: Juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>							

Dunning	●	●			●	●	☰
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 6 jaar.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van het stamtaal. Eénmalig 1/3de van het stamtaal, indien laatste dunning >12 jaar geleden.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 20m). De te kappen bomen zijn regelmatig verspreid over het perceel. Verschillende types dunningen zijn mogelijk (QD, hoogdunning, laagdunning, ...). Hou rekening met beschermde soorten (vleermuizen, burcht, poel,...). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Groepkap	●			●	●	●	☰
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Grootte: Maximum grootte: 0,5ha.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van oppervlakte gedurende beheerplanperiode.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Individuele kap	●					●	☰
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas. Geen dreefbomen.</p>							
Hakhoutkap	●	●	●	●		●	☰
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: Enkel voor bestaande hakhoutbossen of nieuw aangeplante bossen.</p> <p>Grootte: Maximum 0,5ha/jaar aaneengesloten. Hakhoutkap onderverdelen in houwen.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							

Brandhoutkap	●				●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Intensiteit: Jaarlijk maximum 5 m²/hectare.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Voldoende dood hout laten liggen (minstens 4 %). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Veiligheidskap					●		☒
<p>Andere: Beperkt tot gevaarlijke bomen (kwijnend, dood, instabiel) langs recreatieve voorzieningen of infrastructuur.</p>							
Permanent nulbeheer					●		☒
<p>Andere: Niet in combinatie met andere beheermaatregelen.</p>							
Bestrijding plantensoorten		●			●		☒
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>							

BP_9.5 Uitheemse & gemengd inheems-uitheemse bossen

Beheerpakket "BP_9.5 Uitheemse & gemengd inheems-uitheemse bossen"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Terreinvoorbereiding				●		●	
<p>Grootte: Kleinschalig, enkel ter hoogte van verjongingsgroep.</p> <p>Andere: Vermijden verstoring bosbodem (geen bosfrees). Behoud van microreliëf / bodemarchief.</p>							
Aanplant				●		●	
<p>Grootte: Maximum grootte: 0,5ha.</p> <p>Andere: Bij aanplant van boom- en struiksoorten dient het standstillbeginsel in acht worden genomen. Het aanplanten van invasieve uitheemse soorten is uitgesloten. Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Inboeten						●	
<p>Andere: Bij aanplant van boom- en struiksoorten dient het standstillbeginsel in acht worden genomen. Het aanplanten van invasieve uitheemse soorten is uitgesloten. Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.</p>							
Vrijstellen						●	
<p>Andere: Enkel verwijderen van concurrerende vegetatie.</p>							
Zuivering		●				●	
<p>Frequentie: Maximum 1x per 4 jaar.</p> <p>Andere: Zuiveringen eindigen wanneer onderste 2-3 meter van de stammen geen levende takken meer dragen.</p>							
Opsnoeien	●				●		
<p>Tijd: Juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>							
Vormsnoei	●				●		
<p>Tijd: Juni tot augustus voor loofbomen.</p> <p>Intensiteit: Maximum 20% van levende takken.</p>							

Dunning	●	●			●	●	☰
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 6 jaar.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van het stamtal. Eénmalig 1/3de van het stamtal, indien laatste dunning >12 jaar geleden.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 20m). De te kappen bomen zijn regelmatig verspreid over het perceel. Verschillende types dunningen zijn mogelijk (QD, hoogdunning, laagdunning, ...). Hou rekening met beschermde soorten (vleermuizen, burcht, poel,...). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Groepenkap	●			●	●	●	☰
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Grootte: Maximum grootte: 0,5ha.</p> <p>Intensiteit: Maximum 25% van oppervlakte gedurende beheerplanperiode.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							
Individuele kap	●					●	☰
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas. Geen dreefbomen.</p>							
Hakhoutkap	●	●	●	●		●	☰
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: Enkel voor bestaande hakhoutbossen of nieuw aangeplante bossen.</p> <p>Grootte: Maximum 0,5ha/jaar aaneengesloten. Hakhoutkap onderverdelen in hoven.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>							

Brandhoutkap	●					●	●	☒
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Intensiteit: Jaarlijk maximum 5 m²/hectare.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Voldoende dood hout laten liggen (minstens 4 %). Gedurende de planperiode wordt gemiddeld niet meer geoogst dan de natuurlijke aanwas.</p>								
Veiligheidskap							●	☒
<p>Andere: Beperkt tot gevaarlijke bomen (kwijnend, dood, instabiel) langs recreatieve voorzieningen of infrastructuur.</p>								
Permanent nulbeheer							●	☒
<p>Andere: Niet in combinatie met andere beheermaatregelen.</p>								
Bestrijding plantensoorten			●				●	☒
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>								














BP_9.6 Andere bossen & parken

Samenstelling van een beheerpakket is hier niet mogelijk omdat het kan gaan over een te divers assortiment van vegetaties. De beheerder stelt zelf de beheermaatregelen voor in het beheerplan.

Hiervoor kan je in de geodatabank het veld 'SpecifiekBeheerpakket Toelichting' gebruiken en je kan een meer gedetailleerde omschrijving toevoegen als bijlage in het e-loket onder het hoofdstuk 4 beheermaatregelen.














BP_9.7 Boszoom & -mantel_behoud

Beheerpakket "BP_9.7 Boszoom & -mantel_behoud"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Hakhoutkap	●	●	●	●		●	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: Mantelvegetatie in bosrand (intern/extern).</p> <p>Grootte: Breedte bosmantel maximum 1 boomhoogte.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade.</p>							
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●					●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober).</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Geherderde begrazing	●					●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober).</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: bij voorkeur schaap (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Frequentie: 1x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	●	●	●	●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Frequentie: Om de 2 tot 3 jaar.</p> <p>Plaats: Zoomvegetatie in bosrand (intern/extern) en open plekken.</p> <p>Grootte: Breedte boszoom maximum 1 boomhoogte. Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
















BP_9.7 Boszoom & -mantel_herstel

Beheerpakket "BP_9.7 Boszoom & -mantel_herstel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Hakhoutkap	●	●	●	●		●	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: Mantelvegetatie in bosrand (intern/extern).</p> <p>Grootte: Breedte bosmantel maximum 1 boomhoogte.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade.</p>							
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	●					●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober).</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Geherderde begrazing	●					●	
<p>Tijd: In vegetatie seizoen (mei - oktober).</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: bij voorkeur schaap (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
1 x jaarlijks maaien (thooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Frequentie: 1x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	●	●	●	●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober.</p> <p>Frequentie: Om de 2 tot 3 jaar.</p> <p>Plaats: Zoomvegetatie in bosrand (intern/extern) en open plekken.</p> <p>Grootte: Breedte boszoom maximum 1 boomhoogte. Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							

BP_12.1 Mozaïeklandschap

Beheerpakket "BP_12.1 Mozaïeklandschap"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Individuele kap	●					●	
<p>Tijd: Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.</p> <p>Andere: Vermijden bodemschade (vb gebruik vaste ruimingspistes om de 40m). Combinatie van terugkerende maatregelen mogen niet leiden tot afname van biomassa gedurende planperiode. Geen dreefbomen.</p>							
Veiligheidskap						●	
<p>Andere: Beperkt tot gevaarlijke bomen (kwijnend, dood, instabiel) langs recreatieve voorzieningen of infrastructuur.</p>							
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Jaarrondbegrazing				●	●	●	
<p>Grootte: Minimum begrazingsblok van 5ha. Indien inclusief bossen in de grootteorde van 50ha of meer.</p> <p>Intensiteit: Begrazingsdruk afstemmen op uitgangssituatie en vooropgestelde verhouding gras, ruigte, struweel en bos.</p> <p>Andere: Door middel van gedomesticeerde grazers (rond, paard, ezel, schaap, geit), al dan niet in combinatie met wilde herbivoren (Wild zwijn, Ree, Edelhert, Wisent, Eland, Waterbuffel,...). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Seizoensbegrazing				●	●	●	
<p>Grootte: Minimum begrazingsblok van 5ha.</p> <p>Intensiteit: Begrazingsdruk afstemmen op uitgangssituatie en vooropgestelde verhouding gras, ruigte, struweel en bos.</p> <p>Andere: Door middel van gedomesticeerde grazers (rond, paard, ezel, schaap, geit), al dan niet in combinatie met wilde herbivoren (Wild zwijn, Ree, Edelhert, Wisent, Eland, Waterbuffel,...). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Onderhouden van begrazingsinfrastructuur							
Occasioneel maaien	●					●	
<p>Tijd: Maaien vanaf 15 mei tot oktober, ter aanvulling van begrazingsbeheer.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting: gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							
Bestrijding plantensoorten			●			●	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.</p>							
Beheer waterpeil en afvoerdynamiek			●				
<p>Plaats: Beheer beperken tot onderhoud bestaande greppels (max. 30cm diepte).</p>							

BP_12.2 Onbeheerde climaxvegetaties

Beheerpakket "BP_12.2 Onbeheerde climaxvegetaties"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Veiligheidskap						•	
Andere: Beperkt tot gevaarlijke bomen (kwijnend, dood, instabiel) langs recreatieve voorzieningen of infrastructuur.							
Permanent nulbeheer							
Bestrijding plantensoorten			•			•	
Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten. Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan.							

Beheerpakketten - Terugkerende maatregelen beheerobjecten

BP (invasieve) exoot

Beheerpakket "BP_(invasieve) Exoot"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Bestrijding plantensoorten			•			•	
Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten. Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.							










BP Andere weg/pad

Beheerpakket "BP_Andere weg/pad"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Onderhouden van wegen, paden en bruggen					•		
Intensiteit: Wijziging van type verharding en het verbreden van het pad zijn niet toegestaan. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen of strooizout is niet toegestaan. Er wordt gewerkt met niet-vervuld materiaal.							












BP_Beek / Rivier

Beheerpakket "BP_Beek / Rivier"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Kruidruimen	•				•	•	
<p>Tijd: 1ste maaibeurt vanaf 15 juni, 2de maaibeurt vanaf 15 september / binnen SBZ&VEN vanaf augustus tot 15 maart.</p> <p>Intensiteit: Indien waterbodem > 1m breed: maximum 80% van bodembreedte maaien (tov dwarsprofiel) of werken met blokmaaien / patroonmaaien.</p> <p>Andere: Beheerpakket niet van toepassing voor streefbeelden 3260 en 3270. Kruidruimen – maaien waterbodemvegetatie. Binnen SBZ&VEN steeds afwegen tov verstoring. Maaisel toegestaan binnen 5m-zone voor zover niet schadelijk voor aanwezige vegetatie (niet in waterloop of talud deponeren (zelfs niet tijdelijk)).</p>							
Slibruimen	•		•		•	•	
<p>Tijd: Jaarrond, met uitzondering van paai- en broedseizoen (15 maart-31 juli).</p> <p>Plaats: Maximaal behouden van structuurkwaliteit (vb. holle oevers).</p> <p>Intensiteit: Slibruiming maximum tot oorspronkelijk profiel.</p> <p>Andere: beheerpakket niet van toepassing voor streefbeelden 3260 en 3270. De teen van het talud en vaste bodem niet beschadigen. Ruimingsspecie toegestaan binnen 5m-zone voor zover niet schadelijk voor aanwezige vegetatie (niet in waterloop of talud deponeren (zelfs niet tijdelijk)).</p>							

BP_Berm













Beheerpakket "BP_Berm"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Nabegrazing	●				●	●	
<p>Tijd: vanaf augustus (later indien nog te hoog grondwaterpeil)</p> <p>Intensiteit: Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing					●	●	
<p>Intensiteit: > 3GVE/ha als herstel. Begrazing beëindigen indien gras kort gegraasd is.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Intensief maaien (3 x jaarlijks)(hooilandbeheer)	●	●				●	
<p>Tijd: indicatieve maaidata: half mei, begin juli en half oktober</p> <p>Frequentie: 3x per jaar.</p> <p>Andere: afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen). Maaien van wegranden in functie van verkeersveiligheid kunnen uitgevoerd worden buiten de vastgestelde data.</p>							

2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	☰
<p>Tijd: 1ste maaibeurt 1ste helft juli / 2de maaibeurt 2de helft oktober</p> <p>Frequentie: 2x per jaar.</p> <p>Andere: afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen). Maaien van wegranden in functie van verkeersveiligheid kunnen uitgevoerd worden buiten de vastgestelde data.</p>							
2 x jaarlijks vroeg maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	☰
<p>Tijd: 1ste maaibeurt 2de helft mei / 2de maaibeurt 2de helft oktober</p> <p>Frequentie: 2x per jaar.</p> <p>Andere: afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen). Maaien van wegranden in functie van verkeersveiligheid kunnen uitgevoerd worden buiten de vastgestelde data.</p>							
2 x jaarlijks laat maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	☰
<p>Tijd: 1ste maaibeurt augustus, 2de maaibeurt oktober (of nabeweiden)</p> <p>Frequentie: 2x per jaar.</p> <p>Andere: afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen). Maaien van wegranden in functie van verkeersveiligheid kunnen uitgevoerd worden buiten de vastgestelde data.</p>							
1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●				●	☰
<p>Tijd: 2de helft oktober</p> <p>Frequentie: 1x per jaar.</p> <p>Andere: afvoer maaisel, vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen). Maaien van wegranden in functie van verkeersveiligheid kunnen uitgevoerd worden buiten de vastgestelde data.</p>							
Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens)			●			●	☰
<p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>							
Bestrijding plantensoorten		●				●	☰
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>							

BP_Boszoom & -mantel

Beheerpakket "BP_Boszoom & -mantel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Hakhoutkap	•	•	•	•		•	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1x per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: Mantelvegetatie in bosrand (intern/extern).</p> <p>Grootte: Breedte bosmantel maximum 1 boomhoogte.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade.</p>							
Verwijderen spontane houtige opslag	•				•	•	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	•					•	
<p>Tijd: In vegetatiesseizoen (mei - oktober).</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in van uitwerpselen.</p>							
Geherderde begrazing	•					•	
<p>Tijd: In vegetatiesseizoen (mei - oktober).</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: bij voorkeur schaap (geiten voor terugdringen struikopslag). Grazers moeten vrij zijn van ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
1 x jaarlijks maaien (thooilandbeheer)	•	•				•	
<p>Tijd: 2de helft oktober.</p> <p>Frequentie: 1x per jaar.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel. Vermijden bodemverdichting; gebruik brede (en lage druk-)banden (ook bij balenperser / ophalen balen).</p>							

BP_Dreef / Bomenrij

Beheerpakket "BP_Dreef / Bomenrij"

	Tijd	Frequentie	Plaats	Grootte	Intensiteit	Andere	
Vormsnoei	●				●	●	☰
<p>Tijd: November tot maart (buiten broedseizoen).</p> <p>Intensiteit: max. 1/5de van takken .</p> <p>Andere: Het snoeien mag geen schade toebrengen aan de boom en de groeivorm moet behouden blijven.</p>							
Veiligheidskap	●			●		●	☰
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, tenzij bij acuut gevaar.</p> <p>Grootte: Enkel bomen die direct gevaar vormen dat personen verwonden of eigendommen beschadigen.</p> <p>Andere: Individuele heraanplant, bij voorkeur streekeigen, hoogstammige bomen. Plantformaat 10/12.</p>							

BP_Gefaseerde maaizone

Beheerpakket "BP_Gefaseerde maaizone"

	Tijd	Frequentie	Plaats	Grootte	Intensiteit	Andere	
Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens)				●		●	☰
<p>Grootte: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van fauna (wilde bestuivers of kwetsbare soorten). Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>							

BP_Gefaseerde maaizone leefgebied soorten

Beheerpakket "BP_Gefaseerde maaizone leefgebied soorten"

	Tijd	Frequentie	Plaats	Grootte	Intensiteit	Andere	
Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens)				●		●	☰
<p>Grootte: Indicatief 25 % niet maaien.</p> <p>Andere: In functie van ongewervelden. Uitvoering door blokmaaien of sinusmaaien. Afvoer maaisel.</p>							

BP_Greppel (laantjes, zouwen)

Beheerpakket "BP_Greppel (laantjes, zouwen)"

	Tijd	Frequentie	Plaats	Grootte	Intensiteit	Andere	
Herprofilieren (neutrale grondbalans)	●		●		●		☰
<p>Tijd: Circa om de 10 jaar.</p> <p>Plaats: Laantjes van ca 20-35 cm diep en +- 1 m breed.</p> <p>Intensiteit: In functie van behoud en herstel greppels of laantjes (oppervlakkige ontwatering), welke in verbinding staan met afvoersloten.</p>							







BP_Greppel (laantjes, zouwen) leefgebied soorten

Beheerpakket "BP_Greppel (laantjes, zouwen) leefgebied soorten"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Herprofilen (neutrale grondbalans)	•		•		•		
<p>Tijd: Circa om de 10 jaar, buiten broedseizoen.</p> <p>Plaats: Laantjes van ca 20-35 cm diep en +- 1 m breed.</p> <p>Intensiteit: In functie van behoud en herstel greppels of laantjes (oppervlakkige ontwatering), welke in verbinding staan met afvoersloten.</p>							


BP_Haag

Beheerpakket "BP_Haag"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Hagen, struiken en heesters snoeien en scheren						•	
<p>Andere: Snoeisel verwijderen of deels ter plaatse stapelen.</p>							

BP_Haag leefgebied soorten

Beheerpakket "BP_Haag leefgebied soorten"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Hagen, struiken en heesters snoeien en scheren						•	
<p>Andere: Snoeisel verwijderen of deels ter plaatse stapelen.</p>							

BP_Hakhoutzone

Beheerpakket "BP_Hakhoutzone"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Hakhoutkap	•	•		•		•	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1maal per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Grootte: maximum 0,5 ha per jaar (houw)</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade. Takhout verwijderen voor 15 maart of deels ter plaatse stapelen.</p>							

BP_Hakhoutzone leefgebied soorten

Beheerpakket "BP_Hakhoutzone leefgebied soorten"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Hakhoutkap	•	•		•		•	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1maal per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Grootte: maximum 0,5 ha per jaar (houw)</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade. Takhout verwijderen voor 15 maart of deels ter plaatse stapelen.</p>							

BP_Half verharde weg/pad

Beheerpakket "BP_Half verharde weg/pad"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Onderhouden van wegen, paden en bruggen					•		
<p>Intensiteit: Wijziging van type verharding en het verbreden van het pad zijn niet toegestaan. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen of strooizout is niet toegestaan. Er wordt gewerkt met niet-vervuild materiaal.</p>							











BP_Hoogstamboomgaard

Beheerpakket "BP_Hoogstamboomgaard"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Vormsnoei	•					•	
<p>Tijd: november tot maart (buiten broedseizoen)</p> <p>Andere: Het snoeien mag geen schade toebrengen aan de boom en de groeivorm moet behouden blijven.</p>							
Veiligheidskap	•			•		•	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, tenzij bij acuut gevaar.</p> <p>Grootte: Enkel bomen die direct gevaar vormen dat personen verwonden of eigendommen beschadigen.</p> <p>Andere: Individuele heraanplant, bij voorkeur streekeigen fruitbomen. Plantformaat 10/12.</p>							











BP_Houtkant / Houtwal

Beheerpakket "BP_Houtkant / Houtwal"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Individuele kap	•					•	
<p>Tijd: geen exploitatie in april-juni (inclusief ruimen).</p> <p>Andere: De individuele kap mag niet leiden tot ruimtelijk afnemen van de houtkant / houtwal.</p>							
Hakhoutkap	•	•	•	•		•	
<p>Tijd: nov tot febr, niet tijdens strenge vorst</p> <p>Frequentie: Maximum 1maal per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: mantelvegetatie in bosrand (intern/extern)</p> <p>Grootte: bij houtkant > 50m: kapbeurten spreiden in tijd</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade. Takhout verwijderen voor 15 maart of deels ter plaatse stapelen.</p>							
Bestrijding plantensoorten			•			•	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>							











BP_Houtkant / Houtwal leefgebied soorten

Beheerpakket "BP_Houtkant / Houtwal leefgebied soorten"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Individuele kap	•					•	
<p>Tijd: geen exploitatie in april-juni (inclusief ruimen).</p> <p>Andere: De individuele kap mag niet leiden tot ruimtelijk afnemen van de houtkant / houtwal.</p>							
Hakhoutkap	•	•	•	•		•	
<p>Tijd: nov tot febr, niet tijdens strenge vorst</p> <p>Frequentie: Maximum 1maal per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: mantelvegetatie in bosrand (intern/extern)</p> <p>Grootte: bij houtkant > 50m: kapbeurten spreiden in tijd</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade. Takhout verwijderen voor 15 maart of deels ter plaatse stapelen.</p>							
Bestrijding plantensoorten			•			•	
<p>Plaats: Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten.</p> <p>Andere: Gebruik van pesticiden is niet toegestaan. Vermijden bodemschade.</p>							










BP_Kale bodem - microschaal leefgebied soorten

Beheerpakket "BP_Kale bodem - microschaal leefgebied soorten"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	●		●		●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Plaats: Resultaat: op korte afstand kleine plekken met kale bodem.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Plaggen	●	●	●		●	●	
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: Om de 3 tot 5 jaar.</p> <p>Plaats: Resultaat: op korte afstand kleine plekken met kale bodem.</p> <p>Intensiteit: Enkel vegetatie en strooisel, meestal een diepte van 5 tot 10 cm. Het verwijderen van minerale bodem is toegelaten.</p> <p>Andere: afvoeren of lokaal gebruiken (schapenwachtweide en/of kleinschalig akkerbeheer, enkel haalbaar in grote heidegebieden >100ha)</p>							
Chopperen	●	●	●			●	
<p>Tijd: Herfst.</p> <p>Frequentie: Om de 3 tot 5 jaar.</p> <p>Plaats: Resultaat: op korte afstand kleine plekken met kale bodem.</p> <p>Andere: Afvoeren of lokale hopen creëren in functie van fauna.</p>							










BP_Knotboom

Beheerpakket "BP_Knotboom"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Knotten	●				●	●	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Intensiteit: Omlooptijd staken minimum 4 jaar.</p> <p>Andere: Knothout verwijderen voor 15 maart of deels ter plaatse stapelen.</p>							
Veiligheidskap	●			●		●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, tenzij bij acuut gevaar.</p> <p>Grootte: Enkel bomen die direct gevaar vormen dat personen verwonden of eigendommen beschadigen.</p> <p>Andere: Individuele heraanplant, bij voorkeur streekeigen, hoogstammige bomen. Plantformaat 10/12.</p>							

BP_Knotboom leefgebied soorten

Beheerpakket "BP_Knotboom leefgebied soorten"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Knotten	•				•	•	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Intensiteit: Omlooptijd staken minimum 4 jaar.</p> <p>Andere: knothout verwijderen voor 15 maart of deels ter plaatse stapelen</p>							
Veiligheidskap	•			•		•	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, tenzij bij acuut gevaar.</p> <p>Grootte: Enkel bomen die direct gevaar vormen dat personen verwonden of eigendommen beschadigen.</p> <p>Andere: Individuele heraanplant, bij voorkeur streekeigen, hoogstammige bomen. Plantformaat 10/12.</p>							

BP_Knuppelpad

Beheerpakket "BP_Knuppelpad"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Onderhouden van wegen, paden en bruggen					•		
<p>Intensiteit: Wijziging van type verharding en het verbreden van het pad zijn niet toegestaan. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen of strooizout is niet toegestaan. Er wordt gewerkt met niet-vervuld materiaal.</p>							













BP_Onverharde weg/pad

Beheerpakket "BP_Onverharde weg/pad"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Onderhouden van wegen, paden en bruggen					•		
<p>Intensiteit: Wijziging van type verharding en het verbreden van het pad zijn niet toegestaan. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen of strooizout is niet toegestaan. Er wordt gewerkt met niet-vervuld materiaal.</p>							











BP_Permanente open plek

Beheerpakket "BP_Permanente open plek"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Hakhoutkap	•	•	•	•		•	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1maal per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: mantelvegetatie in bosrand (intern/extern)</p> <p>Grootte: Maximum 0,5 ha.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade. Takhout verwijderen voor 15 maart of deels ter plaatse stapelen.</p>							
Rotatiebegrazing / Stootbegrazing	•			•	•	•	
<p>Tijd: in vegetatie seizoen (mei - oktober)</p> <p>Grootte: Maximum 0,5 ha.</p> <p>Intensiteit: Maximum 2GVE/ha.jaar.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
Geherderde begrazing	•			•	•	•	
<p>Tijd: in vegetatie seizoen (mei - oktober)</p> <p>Grootte: Maximum 0,5 ha.</p> <p>Intensiteit: Maximum 2GVE/ha.jaar.</p> <p>Andere: Te gebruiken grazers: rund, paard, ezel, schaap, geit. Grazers moeten vrij zijn ontwormingsmiddelen in uitwerpselen.</p>							
1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	•					•	
<p>Tijd: vanaf augustus (omwille van zaadzetting)</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	•	•	•	•	•	•	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur eind augustus tot half oktober</p> <p>Frequentie: Om de 2 tot 3 jaar.</p> <p>Plaats: Zoomvegetatie in bosrand (intern/extern) en open plekken.</p> <p>Grootte: Maximum 0,5 ha.</p> <p>Intensiteit: Indicatief 10-25 % niet maaien.</p> <p>Andere: Afvoer maaisel.</p>							














BP_Plagplek

Beheerpakket "BP_Plagplek"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Verwijderen spontane houtige opslag	•				•	•	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Plaggen	•	•	•	•	•	•	
<p>Tijd: herfst</p> <p>Frequentie: 3-5 jaar voor pioniervegetaties / 5-15jaar met heide</p> <p>Plaats: Bij voorkeur kleinschalig of in visgraat-motief (in functie van afwatering)</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m².</p> <p>Intensiteit: Enkel vegetatie en strooisel, meestal een diepte van 5 tot 10 cm. Het verwijderen van minerale bodem is toegelaten.</p> <p>Andere: afvoeren of lokaal gebruiken (schapenwachtweide en/of kleinschalig akkerbeheer, enkel haalbaar in grote heidegebieden >100ha)</p>							
Chopperen	•	•		•		•	
<p>Tijd: herfst</p> <p>Frequentie: 3-5 jaar voor pioniervegetaties / 5-15jaar met heide</p> <p>Grootte: Bij voorkeur minimaal 100m², maximum 10%.</p> <p>Andere: afvoeren of lokale hopen creëren in functie van fauna</p>							















BP_Poel

Beheerpakket "BP_Poel"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Hakhoutkap	●	●	●			●	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1maal per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: oeverzone</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade. Takhout verwijderen voor 15 maart of deels ter plaatse stapelen.</p>							
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Herprofilen (neutrale grondbalans)	●	●			●		
<p>Tijd: najaar (september-oktober)</p> <p>Frequentie: enkel als verlanding te ver gevorderd is</p> <p>Intensiteit: Deel van watervegetatie / oevervegetatie wordt gespaard.</p>							
Kruidruimen		●		●	●		
<p>Frequentie: Jaarlijks tot zeer lage frequentie (min. 10 jaar), afhankelijk van eutrofiëring.</p> <p>Grootte: Gecontroleerd, enkel kleine plekken (enkele are).</p> <p>Intensiteit: Gefaseerd binnen de poel of tussen verschillende poelen in beheer.</p>							
Slibruimen	●	●	●	●	●		
<p>Tijd: Nazomer of bij laagste waterstand.</p> <p>Frequentie: Om de paar jaar tot om de tientallen jaren nodig (afhankelijk van afmetingen, vorm, ligging...).</p> <p>Plaats: Maximaal behouden van structuurkwaliteit (vb. holle oevers).</p> <p>Grootte: helft per keer ruimen, andere helft enkele jaren later</p> <p>Intensiteit: Slibruiming maximum tot oorspronkelijk profiel.</p>							
1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	●	●	●				
<p>Tijd: Buiten broedseizoen.</p> <p>Frequentie: gefaseerd (slechts deel van begroeiing per keer)</p> <p>Plaats: oeverzone</p>							

BP_Poel leefgebied soorten

Beheerpakket "BP_Poel leefgebied soorten"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Hakhoutkap	•	•	•			•	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1maal per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: oeverzone</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade. Takhout verwijderen voor 15 maart of deels ter plaatse stapelen.</p>							
Verwijderen spontane houtige opslag	•				•	•	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Herprofileren (neutrale grondbalans)	•	•			•	•	
<p>Tijd: Najaar (september-oktober).</p> <p>Frequentie: Enkel als verlanding te ver gevorderd is.</p> <p>Intensiteit: Deel van watervegetatie / oevervegetatie wordt gespaard.</p> <p>Andere: Optimaal: ondiep water (max. 1,5m diep) met zacht glooiende, ondiepe noordzijde ivf opwarming water. Ondiep water zal door occasioneel uitdrogen eveneens een lagere kans op visaanwezigheid teweegbrengen.</p>							
Kruidruimen		•		•	•		
<p>Frequentie: Jaarlijks tot zeer lage frequentie (min. 10 jaar), afhankelijk van eutrofiëring.</p> <p>Grootte: Gecontroleerd, enkel kleine plekken (enkele are).</p> <p>Intensiteit: Gefaseerd binnen de poel of tussen verschillende poelen in beheer.</p>							
Slibruimen	•	•	•	•	•		
<p>Tijd: Nazomer of bij laagste waterstand.</p> <p>Frequentie: Om de paar jaar tot om de tientallen jaren nodig (afhankelijk van afmetingen, vorm, ligging,...).</p> <p>Plaats: maximaal behouden van structuurkwaliteit (vb. holle oevers)</p> <p>Grootte: helft per keer ruimen, andere helft enkele jaren later</p> <p>Intensiteit: Slibruiming maximum tot oorspronkelijk profiel.</p>							
1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	•	•	•				
<p>Tijd: Buiten broedseizoen.</p> <p>Frequentie: gefaseerd (slechts deel van begroeiing per keer)</p> <p>Plaats: oeverzone</p>							
Tijdelijk droogzetten						•	
<p>Andere: In functie van visvrij houden van de poel.</p>							













BP_Sloot / Gracht

Beheerpakket "BP_Sloot / Gracht"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Kruidruimen	•				•		
<p>Tijd: 1ste maalbeurt vanaf 15 juni, 2de maalbeurt vanaf 15 september / binnen SBZ&VEN vanaf augustus tot 15 maart.</p> <p>Intensiteit: Indien waterbodem > 1m breed: maximum 80% van bodembreedte maaien (tov dwarsprofiel) of werken met blokmaaien / patroonmaaien.</p>							
Slibruimen	•		•		•	•	
<p>Tijd: Jaarrond, met uitzondering van paai- en broedseizoen (15 maart-31 juli).</p> <p>Plaats: Maximaal behouden van structuurkwaliteit (vb. holle oevers).</p> <p>Intensiteit: Slibruiming maximum tot oorspronkelijk profiel.</p> <p>Andere: Beheerpakket niet van toepassing voor streefbeeld 3260 en 3270. Kruidruimen – maaien waterbodemvegetatie. Binnen SBZ&VEN steeds afwegen tov verstoring. Maaisel toegestaan binnen 5m-zone voor zover niet schadelijk voor aanwezige vegetatie (niet in waterloop of talud deponeren (zelfs niet tijdelijk)).</p>							

BP_Traditionele vijver leefgebied soorten












Beheerpakket "BP_Traditionele vijver leefgebied soorten"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Hakhoutkap	●	●	●			●	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1maal per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: oeverzone</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade. Takhout verwijderen voor 15 maart of deels ter plaatse stapelen.</p>							
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Onderhouden van hydrologische infrastructuur						●	
<p>Andere: Reinigen van filters van de vijver (indien aanwezig).</p>							
Herprofileren (neutrale grondbalans)	●	●			●		
<p>Tijd: Najaar (september-oktober).</p> <p>Frequentie: Enkel als verlanding te ver gevorderd is.</p> <p>Intensiteit: Deel van watervegetatie / oevervegetatie wordt gespaard.</p>							
Kruidruimen		●		●	●		
<p>Frequentie: Jaarlijks tot zeer lage frequentie (min. 10 jaar), afhankelijk van eutrofiëring.</p> <p>Grootte: Gecontroleerd, enkel kleine plekken (enkele are).</p> <p>Intensiteit: Gefaseerd binnen de vijver of tussen verschillende vijvers in beheer.</p>							

Slibruimen	●	●	●	●	●	●	☐
<p>Tijd: Nazomer of bij laagste waterstand.</p> <p>Frequentie: Om de paar jaar tot om de tientallen jaren nodig (afhankelijk van afmetingen, vorm, ligging,...).</p> <p>Plaats: Maximaal behouden van structuurkwaliteit (vb. holle oevers).</p> <p>Grootte: helft per keer ruimen, andere helft enkele jaren later</p> <p>Intensiteit: Slibruiming maximum tot oorspronkelijk profiel.</p> <p>Andere: Beheerpakket niet van toepassing voor streefbeeld 3260 en 3270. Kruidruimen = maaien waterbodemvegetatie. Binnen SBZ&VEN steeds afwegen tov verstoring. Maaisel toegestaan binnen 5m-zone voor zover niet schadelijk voor aanwezige vegetatie (niet in waterloop of talud deponeren (zelfs niet tijdelijk)).</p>							
1 x jaarlijks maaien (hoilandbeheer)	●	●	●				☐
<p>Tijd: Buiten broedseizoen.</p> <p>Frequentie: gefaseerd (slechts deel van begroeiing per keer)</p> <p>Plaats: oeverzone</p>							
Afvissen		●				●	☐
<p>Frequentie: Minstens driejaarlijks voor kleine vijver, minstens zesjaarlijks voor grote vijver.</p> <p>Andere: Frequentie afgestemd op tijdelijk droogzetten.</p>							
Bepoten			●			●	☐
<p>Plaats: Ruimtelijk variëren tussen vijvers, indien mogelijk.</p> <p>Andere: Geen bepoting toegestaan, indien ifv leefgebied van libellen en amfibieën. Vispoot gebruiken met soorten als baars en vetje.</p>							
Tijdelijk droogzetten		●					☐
<p>Frequentie: Minstens driejaarlijks voor kleine vijver, minstens zesjaarlijks voor grote vijver.</p>							

BP_Traditionele vijver met maaien leefgebied soorten

Beheerpakket "BP_Traditionele vijver met maaien leefgebied soorten"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Kruidruimen		•		•	•		
<p>Frequentie: Jaarlijks tot zeer lage frequentie (min. 10 jaar), afhankelijk van eutrofiëring.</p> <p>Grootte: Gecontroleerd, enkel kleine plekken (enkele are).</p> <p>Intensiteit: Gefaseerd binnen de vijver of tussen verschillende vijvers in beheer.</p>							
1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	•	•	•	•		•	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen. Vijverbodem voldoende droog.</p> <p>Frequentie: Jaarlijks (indien vijver jaarlijks wordt drooggelegd).</p> <p>Plaats: Enkel indien groot aantal vijvers aanwezig.</p> <p>Grootte: Maximum 6 vijvers / 10% van vijvers.</p> <p>Andere: Successie naar rietfase terugzetten (doel: ijle vegetatiestructuur in het water). Vermijden bodemcompactatie. Afvoeren maaisel.</p>							
Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	•	•	•	•		•	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen. Vijverbodem voldoende droog.</p> <p>Frequentie: Tweejaarlijks (indien vijver tweejaarlijks wordt drooggelegd).</p> <p>Plaats: Enkel indien groot aantal vijvers aanwezig.</p> <p>Grootte: Maximum 6 vijvers / 10% van vijvers.</p> <p>Andere: Successie naar rietfase terugzetten (doel: ijle vegetatiestructuur in het water). Vermijden bodemcompactatie. Afvoeren maaisel.</p>							
Tijdelijk droogzetten		•	•	•		•	
<p>Frequentie: Jaarlijks tot tweejaarlijks droogleggen (visvrij houden).</p> <p>Plaats: Enkel indien groot aantal vijvers aanwezig.</p> <p>Grootte: Maximum 6 vijvers / 10% van vijvers.</p> <p>Andere: In functie van goede populatie van zeer specifieke soorten (Knoflookpad, Kempense heidelibel, Speerwaterjuffer, Maanwaterjuffer, Hoogveenglanslibel).</p>							














BP_Verharde weg/pad

Beheerpakket "BP_Verharde weg/pad"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Onderhouden van wegen, paden en bruggen					•		
<p>Intensiteit: Wijziging van type verharding en het verbreden van het pad zijn niet toegestaan. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen of strooizout is niet toegestaan. Er wordt gewerkt met niet-vervuild materiaal.</p>							

BP_Vijver

Beheerpakket "BP_Vijver"

	 Tijd	 Frequentie	 Plaats	 Grootte	 Intensiteit	 Andere	
Hakhoutkap	●	●	●			●	
<p>Tijd: November tot februari.</p> <p>Frequentie: Maximum 1maal per 8 jaar (1x per 6 jaar voor zeer snel groeiende soorten, zoals wilg en zwarte els).</p> <p>Plaats: Oeverzone.</p> <p>Andere: Max. 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Schuin zaagvlak, ca. 15 cm boven de bodem. Vermijden bodemschade. Takhout verwijderen voor 15 maart of deels ter plaatse stapelen.</p>							
Verwijderen spontane houtige opslag	●				●	●	
<p>Tijd: Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.</p> <p>Intensiteit: Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.</p> <p>Andere: Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.</p>							
Herprofilen (neutrale grondbalans)	●	●			●		
<p>Tijd: Najaar (september-oktober).</p> <p>Frequentie: Enkel als verlanding te ver gevorderd is.</p> <p>Intensiteit: Deel van watervegetatie / oevervegetatie wordt gespaard.</p>							
Kruidruimen		●		●	●		
<p>Frequentie: Jaarlijks tot zeer lage frequentie (min. 10 jaar), afhankelijk van eutrofiëring.</p> <p>Grootte: Gecontroleerd, enkel kleine plekken (enkele are).</p> <p>Intensiteit: Gefaseerd binnen de vijver of tussen verschillende vijvers in beheer.</p>							
Slibruimen	●	●	●	●	●	●	
<p>Tijd: Nazomer of bij laagste waterstand.</p> <p>Frequentie: Om de paar jaar tot om de tientallen jaren nodig (afhankelijk van afmetingen, vorm, ligging,...).</p> <p>Plaats: Maximaal behouden van structuurkwaliteit (vb. holle oevers).</p> <p>Grootte: heft per keer ruimen, andere heft enkele jaren later</p> <p>Intensiteit: Slibruiming maximum tot oorspronkelijk profiel.</p> <p>Andere: Beheerpakket niet van toepassing voor streefbeeld 3260 en 3270. Kruidruimen = maaien waterbodenvvegetatie. Binnen SBZ&VEN steeds afwegen tov verstoring. Maaisel toegestaan binnen 5m-zone voor zover niet schadelijk voor aanwezige vegetatie (niet in waterloop of talud deponeren (zelfs niet tijdelijk)).</p>							
1 x jaarlijks maaien (hoilandbeheer)	●	●	●				
<p>Tijd: Buiten broedseizoen.</p> <p>Frequentie: Gefaseerd (slechts deel van begroeiing per keer).</p> <p>Plaats: oeverzone</p>							

Enmalige maatregelen – randvoorwaarden

Terreinvoorbereiding

Randvoorwaarden	
Tijd	Indien voorjaarsvegetatie: niet in maart-april.
Intensiteit	Bosfrees enkel bij naaldhout of bij landurig braak terrein (sterke verruiging). Klepelmaaier enkel ifv terugdringen/bestrijden invasieve exoten.

Aanplant

Randvoorwaarden	
Grootte	Rekening houden met afstandsregels veldwetboek https://www.ecopedia.be/pagina/bomen-planten-plantafstanden-en-vergunningsplichten-uit-het-veldwetboek-en-burgerlijk-wetboek .
Intensiteit	Enkel plantputten zijn toegelaten, voor andere voorbereidende maatregelen moet terreinvoorbereiding worden aangevraagd. Voor bemesting/bekalking moet ontheffing aangevraagd worden.
Andere	Voor bossen met natuurstreefbeeld: minimum 70% van sleutelsoorten (cfr. LSVI). Maximum 30% inheemse verplegende soorten (ifv bodemkwaliteit / omvorming zonder bestrijdingsmiddelen / resiliëntie verhogen). Geen archeofyten. Andere bossen: Stand-still-principe van toepassing: geen aanplant van niet-inheems na inheems / naaldhout na loofhout. Aanplant van Grove den kan na niet-inheems loofhout. Niet-afbreekbaar materiaal voor plantenbescherming tijdig verwijderen.

Kaalkap

Randvoorwaarden	
Tijd	Geen exploitatie in maanden april, mei en juni (vellen & ruimen). Indien voorjaarsvegetatie: bijkomend geen exploitatie in maart.
Plaats	100m tussen zones kaalkap.
Grootte	Maximum 1ha (maximum 3ha bij omvorming van niet-inheems naar inheems of bij heraanplant van populier met onderetage met inheemse soorten). Geen maximum oppervlakte indien open natuurstreefbeelden tot doel worden gesteld.
Intensiteit	Indien <100m: tussentijd van minstens 3 jaar.
Andere	Indien actueel habitat: kroonhout ter plaatse laten liggen.

Individuele kap

Randvoorwaarden	
Grootte	In functie van individuele bomen.

Gefaseerde eindkap (dreven en bomenrijen)

Ringen

Randvoorwaarden	
Intensiteit	Maximum 25% van het stamtal.
Andere	Niet langs recreatieve voorzieningen of infrastructuur. De te ringen bomen zijn regelmatig verspreid over het perceel.

Omtrekken

Sanitaire kap

Randvoorwaarden	
Andere	Indien bomen ziek zijn, of om ziekten te voorkomen (vb bij schorskever, vorstschade, wortelrot, ...).

Verwijderen spontane houtige opslag

Randvoorwaarden	
Tijd	Buiten broedseizoen, bij voorkeur herfst / winter.
Intensiteit	Afvoeren of stapelen op ecologisch geschikte locatie. Verbranden niet toegelaten, tenzij op vuurplaats, opgenomen in het beheerplan.
Andere	Vermijden van bodemverdichting. Het verwijderen van de spontane houtige opslag mag niet leiden tot ontbossing of wijziging van de bosbalans op planniveau.

Ontstronken

Aanleggen van overige infrastructuur

Afbreken van overige infrastructuur

Aanleggen van wegen, paden en bruggen

Randvoorwaarden	
Grootte	Ontbossing indien aanleg van wegen uitgevoerd wordt met (semi-)verharding en/of indien wegzate in functie van gemotoriseerd verkeer.

Afbreken van wegen, paden en bruggen

Aanleggen van recreatieve infrastructuur

Randvoorwaarden	
Grootte	Vrijstelling van omgevingsvergunning voor kleinschalige toeristisch-recreatieve infrastructuur zoals zitbanken, picknicktafels, vuilnisbakken, fietsenrekken, speeltoestellen, infopanelen en infokiosken.
Andere	Indien geen vrijstelling: omgevingsvergunning noodzakelijk naast goedkeuring natuurbeheerplan.

Afbreken van recreatieve infrastructuur

Aanleggen van begrazingsinfrastructuur

Afbreken van begrazingsinfrastructuur

Aanleggen van bosverjongingsinfrastructuur (boombescherming en rasters)

Afbreken van bosverjongingsinfrastructuur (boombescherming en rasters)

Aanleggen van ecologische infrastructuur

Afbreken van ecologische infrastructuur

Aanleggen van monitoringsinfrastructuur

Afbreken van monitoringsinfrastructuur

Aanleggen van hydrologische infrastructuur

Afbreken van hydrologische infrastructuur

Aanleggen van dienstinfrastructuur

Afbreken van dienstinfrastructuur

Aanleggen van jachtinfrastructuur

Randvoorwaarden	
Grootte	Hoogzit: vrijstelling omgevingsvergunning in agrarisch gebied.
Andere	Voor een hoogzit: omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig in ruimtelijk kwetsbaar gebied (natuurgebied, bosgebied, valleigebied,...).

Afbreken van jachtinfrastructuur

Afgraven – uitgraven

Randvoorwaarden	
Plaats	Duidelijkheid noodzakelijk of grond lokaal wordt hergebruikt of wordt afgevoerd.
Grootte	Vrijstelling omgevingsvergunning voor het uitvoeren van reliëfwijzigingen van minder dan een meter of voor het graven van een poel van maximum 100m ² .
Andere	Indien geen vrijstelling: omgevingsvergunning noodzakelijk naast goedkeuring natuurbeheerplan.

Herprofilen (neutrale grondbalans)

Randvoorwaarden	
Grootte	Vrijstelling omgevingsvergunning voor het uitvoeren van reliëfwijzigingen van minder dan een meter.
Andere	Indien geen vrijstelling: omgevingsvergunning noodzakelijk naast goedkeuring natuurbeheerplan.

Ophogen

Randvoorwaarden	
Plaats	Duidelijkheid noodzakelijk of grond lokaal wordt hergebruikt of wordt afgevoerd.
Grootte	Vrijstelling omgevingsvergunning voor het uitvoeren van reliëfwijzigingen van minder dan een meter.
Andere	Indien geen vrijstelling: omgevingsvergunning noodzakelijk naast goedkeuring natuurbeheerplan.

Plaggen

Randvoorwaarden	
Tijd	Hou rekening met effecten op o.a. fauna: bij voorkeur begin juli (na broedseizoen of nazomer (eind augustus-begin september).
Frequentie	Maximum 1maal in planperiode.
Plaats	Afvoer plagmateriaal mag niet leiden tot vegetatiewijzigingen.
Grootte	Bij voorkeur minimaal 100m ² , geen te grote oppervlakten tegelijk plaggen (enkele are) in mozaïek met ongeplagde delen als "vluchtplaats" of in visgraatmotief.
Andere	Optimale plagdiepte bepalen (inschakelen van specialisten), bekalken na plaggen kan nuttig zijn, maar na grondige (bodem)analyse.

Chopperen

Randvoorwaarden	
Andere	Afvoeren of lokale hopen creëren in functie van fauna. In grasland om vervilting tegen te gaan.

Kruidruimen

Randvoorwaarden	
Andere	De uitvoering gebeurt alleen tijdens perioden met normale waterstand en bij voldoende (normale) helderheidsgraad van het water.

Slibruimen

Randvoorwaarden	
Tijd	Nazomer of bij laagste waterstand.

Mestgift

Randvoorwaarden	
Intensiteit	In graslanden maximum 60 tot 80 kg N/jaar.
Andere	Aanvaardbare dosis bepalen obv bodemanalyse. Bij voorkeur gebruik van vaste stalmest.

Bekalken

Randvoorwaarden	
Tijd	Kort na het plaggen.
Intensiteit	Tot 50% van basenverzadiging (ca 2ton dolokal/ha).
Andere	Aanvaardbare dosis bepalen obv bodemanalyse. Meestal dolokal (Ca & Mg bevattende kalk) of mengsel dolokal-mergel.

Belemen

Randvoorwaarden	
Tijd	Kort na het plaggen.
Intensiteit	Circa 1cm.
Andere	Aanvaardbare dosis bepalen obv bodemanalyse. Leem van lokale oorsprong.

Uitmijnen

Beheer bufferend vermogen

(her)introductie plantensoorten

Randvoorwaarden	
Andere	De leidraad translocaties voor biodiversiteit https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/41967 dient gevolgd te worden.

(her)introductie diersoorten

Randvoorwaarden	
Andere	De leidraad translocaties voor biodiversiteit https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/41967 dient gevolgd te worden.

Bestrijding plantensoorten

Randvoorwaarden	
Plaats	Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten, zie https://www.ecopedia.be/pagina/exoten .
Andere	Gebruik van glyfosaat is verboden. Gebruik van bestrijdingsmiddelen is verboden, tenzij afwijking wordt aangevraagd en gemotiveerd.

Bestrijding diersoorten

Randvoorwaarden	
Plaats	Enkel in functie van invasieve uitheemse soorten, zie https://www.ecopedia.be/pagina/exoten .

Brandpreventie

Waterkwaliteitsbeheer

Tijdelijk droogzetten

Verstuivingsbeheer

Andere